

B. C. D.
DISSERTATIO MEDICA
De

UMBILICO

ET

VASSIS UMBILICALIBUS,

QUAM

IN PERANTIQUA ELECTORALI
PALATINATUS RHENI UNIVERSITATE
SUB CLYPEO

VIRI NOBILISSIMI, AMPLISSIMI ATQUE
EXPERIENTISSIMI

DN. GEORGII FRANCI,
MED. DOCT. ET P. P. FAMIGERATIS-
SIMI, ORDINIS SUI h. t. DECANISPE-
CTATISSIMI, DN. PATRONI, PROMO-
TORIS ET PRÆCEPTORIS SVI
COLENDISSIMI;

Placida Philiatorum ventilationi exhibens

Ad Diem Ianuarii,

A. O. R. c^o l^o c LXXIII.

H. L. 2. S.

Defendet

BENEDICTUS HERMANNUS, Memmingensis,
AUCT. ET RESP.

TYPIS JOH. CHRISTIANI WALTERI,
ACAD. TYPOGR.

V I R I

MAGNIFICE , MAXIME STRENUI , NOBILISSIMI , AMPLISSIMI

DN. EITEL SIGISMUNDE Lupin. } Inclutæ S.R.I. Lib. Rei.
 DN. JOH. MATTHÆE Hartlieb. } publ. Memmingensis
 DN. JOH. JACOBÆ Koch. } Consules Prudentissimi.
 DN. JOHANNES Wachter / Prætor Consultissime.
 DN. HIERONYME Schermair. } à Secretioribus Con-
 DN. WILHELME Zoller. } filiis.
 DN. JOSEPHE Zenisch / U. J. L. Celeberrime , Reipubl.
 Patriæ Syndice, aliorumque Statuum Consiliarie Gravissime.
 DN. M. TOBIA Hermann / Ecclesiæ Patriæ Minister fidelissi-
 me , Parens dilectissime.
 DN. JACOBÆ Schük / Archigramateu Spectatissime, Affi-
 nis honoratissime.

*Dnn. Mecanates , Patroni , Evergetæ
 atque Promotores observantissime co-
 lendi :*

Omina principiis inesse solent ! *Principium hîc Vobis meum ;
 cui DEUS superaddat finem beatum ! Omen si ominemini,
 habebitis hîc observantiam consuetudinis priscae , sed laudabilis :
 illic $\mu\eta\eta\mu\sigma\tau\acute{o}\nu\eta\eta$ gratitudinis, sed macra : pietatis ibi $\lambda\epsilon\kappa\mu\eta\sigma\iota\sigma\iota\omega\nu$, sed
 infucata ! Nimirum , ne vos pæniteat clientis , nève Patronis
 ego diffidam , conatum primum è Vobis oriundum ad Vos regre-
 diendum putavi. Suscipite suscepti cepta : qui Strenam mittit
 Omnipotentis Clementiam & Benedictionem*

fidelis ac devotus cliens

*Benedictus Hermannus , Memming.
 Auct. & Resp.*

Proœmium.



*V*ix ullibi minùs quàm in minimis otiosam esse Naturam, sexcentis prònum esset demonstrare exemplis, ex Macro & Micro-cosmo depromptis, si id instituti nostri perferret ratio. Scilicet, voluit hac methodo non in sui duntaxat admirationem nos rapere sapiens hac rerum Magistra; quin potiùs ad sua adyta alacriter penetranda quemvis sui Studiosum instigare, maximè tamen eos, quibus dedit à se vocari *NATURÆ MINISTROS, MEDICOS*. Quos, si unquam, hoc sanè quo vivimus, sæculo quàm maximè habuit obsequiosos, haud exiguo nostro ad Eorum pedes sedentium emolumento, quippe quibus vel mirutissimas etiam valvulas, minutissima vascula, ad irrorandas succo suo corporis humani partes apta nata lynceo Eorum oculo jamjam videre licet, & quales ipsis tam in conservandâ quàm destruendâ Microcosmi sui fabricâ, vires concesserit Natura, perspicere. Sequamur ergò & nos hac vice Eorum ductum, tentantes nostram locare opellam in explicandâ quadam corporis humani parte, & ipsâ quidem adpectu parvâ; usu verò satis magnâ; Microcosmi scilicet centro, *UMBILICO*. A quo proposito licet penè me absteruisset C. HOFMANNUS, Medicus aliàs Oraculi instar habendus, dùm Comment. in Gal. (a) umbilicum in animali perfectò *INANE tantum NOMEN* vocat: in potiori tamen loco, quæ subsequutura sunt, apud me fuerunt.

(a) l. XV.
de V. P. c.
4. n. 1676.

Adsis ergò nostris conatibus Benignissime *DEUS*, & faxis, ut quam aggredimur de *UMBILICO* Dissertationem, ad umbilicum perducamus *FELICITER*!



C A P. I.

De Onomatologia.



Unt nomina notæ rei, & Græcis ὀνομα, secundum Scaligerum (a) dicitur, q̄. ὀνέομα, à juvando sc. in rerum ipsarum cognitionem. Meritò itaque & nos nominis præmittimus notationem ipsius rei descriptioni. Et eò quidem magis, quò latius sese vocis nostræ ὀμνυμπα in aliis qq. Medicinæ Objectis denominandis diffundit. Impropiè namque quando accipitur umbilici vocabulum, denotat rem

vel *Situ* cum umbilico propriè dicto communem, vel *figurâ*. Si *illud*, umbilicus significat omne id, quod in aliquâ re est medium. Hinc *Plautus* (b) ait: Dies quidem jam ad umbilicum est dimidiatus mortuus, id est, ut benè adnotavit *Lambin.* jam meridies est. Ita quod in pomis vel conditur, vel prominet, ab adversâ pediculi parte, umbilicus dicitur, teste *Corvino* (c) Pari ratione *umbilicus Solis* vocatur exiguus ille circulus, cujus in medio gnomon figitur, aut quem medium intersecant lineæ in sciaterico amufiove, *Id. ib.* Porro locus, quòd in mediâ est Insulâ situs, *umbilicus Sicilia* nominatur *Ciceroni*. (d) Nec non Hierosolyma, quòd credebatur olim, quamvis ex falsâ hypothesi, in Terræ medio exstitisse, *umbilicus Terræ* audiebat. Quod idem nomen, sed & eodem jure, superstitioso præterea Corvorum (vel, ut *Plutarcho* placet, olorum) volatu decepti antiqui Græci, Delphis, famoso illi Apollinis Claustro, vindicant, teste *Varrone* (e) & *Strabone* l. 9. Transibat hinc idem *umbilici Terræ* nomen etiam in materiam medicam, & herbam illam, quæ aliis *Cyclamen*, *arthanita*, *panis porcinus*, &c. dicitur,

Trago

(a) de caus.
L. Lat. c.
76.

(b) Me-
nachm.
act. 1.

(c) font.
lat. in voc.
umbilicus

(d) 6. in
Verr.

(e) de L.
Lat. l. 6.
col. 49.

Trago designabat ; propter figuram forsan , quâ cum nostro umbilico convenit. Est & alia planta , *umbilicus Veneris Matthiolo* dicta , quæ *Dioscoridi* (f) *κοιλυηδών* est , scil. à figurâ folii acetabulo simili , teste *Baubino*. (g) Sed *umbilicus Veneris* officinarum *Loniceri* est vulgò dicta *Cymbalaria* , *Bauh.* (h) Porro umbilici veneris species altera *Anguillara* , est *Sedum* majus vulgare. Similem figuram obtinet quædam fuci subrotundi species *Imperati* , hinc sibi nomen *umbilici marini* contraxit , ap. *Baubin.* (i) Umbilicus verò *Marinus* *Monspeliensium* est *Androsace Lobelii & Lugdan. Bauhin.* (k) Repertur & in mari lapis , qui referente *Boëtio* (l) umbilici humani similitudinem & magnitudinem habet ; unde etiam obtinuit *umbilicus marinus* , item *umbilicus Veneris* dici. Videtur hic lapis diligenter intuenti conchæ esse rudimentum , aut concha compressa , spiras enim habet in gyrum actas , teste *Auctore append. ad Pharmacop. Schröderi p. 19.* Hinc forsan est , quòd *Corvinus l. c. ai.* : esse genus concharum marinarum , quæ umbilici dicantur. Quamvis & apud *Ciceronem* (m) umbilici nominentur calculi littorales , umbilici puellatis specie , è lato se in acutum quadam claviculâ fastigantes , quos *Veneris umbilicos* quidam vocant , teste *Adr. Turneb.* (n) Restat adhuc alia satis aliàs usitata vocis hujus significatio , quâ Interprete *Porphyrio* , denotat ornamenta quædam ossea , aut lignea , corneave , umbilici nostri formam imitantia , quæ voluminibus jam absolutis addebantur , uti & *Lambinus* (o) animadvertit : unde ortum suum traxit tritum illud , quo rem qui fermè absolvit , ad umbilicum deduxisse dicitur ; ita loquitur *Martialis*. (p) Sed , ut diximus , mutuata sunt hæ res suam denominationem ab eâ corporis nostri parte , quæ in medio abdominis sita , propriè *umbilicus* dicitur : Et vel consideratur , ut in *feru* est , vel ut in *adulto* ; vel rursus , ut in *abstracto* involucrum tantum , vel receptaculum est vasorum suorum ; vel in *concreto* cum vasis junctus , unam partem constituit. Circa quæ in seqq. erimus occupati.

Pergimus ad *Etymologiam* brevibus absolvendam. Dictum quidam volunt umbilicum à Græcâ , idem denotante , voce *ὀμφαλός* , *ὀμφαλινός* , φ in b , ut vulgo obsonium , inquit *Becman* (q) Magis tamen arridet deductio *Fabri* cui & *Bartholinus* (r) adstipulatur , originem sc. suam trahere ab *umbone* , quæ vox quicquid in

- (f) l. 4. c. 92.
(g) Pinac. l. 7. f. 5. fol. 285.
(h) l. c. l. 8. f. 3. f. 307.
(i) l. c. l. 10. f. 4. f. 364.
(k) l. c. f. 367.
(l) l. 2. de gemm. & lap. c. 177.
(m) l. 2. de Orator.
(n) advers. l. 24. c. 46.
(o) ad Hor. Epod. 14.
(p) l. iv. c. pigr. 91. l. 67. 111. 46. v. 6.
(q) de Orig. L. L. p. 815.
(r) A. R. l. l. c. 37. p. 198.

plano eminet, significat, quod commodè etiam de nostro dicitur umbilico. Nec aded absona est, ut aliæ nonnullæ, quas affert, *Isidori* derivatio, qui compositam quasi vult nostram vocem ex *um-bo* & *ilium*, quod sc. ibidem loci sit umbo iliorum (f.)

(f) Orig. l. ix, p. 1098.

Quod *Synonymiam* attinet: Græcis *ὀμφαλὸς* communiter; *Aristoteli* verò peculiariter, quoniam edito in lucem primò omnium abscinditur, *πρόμνησις*, teste *Lauremberg*. (t) quo nomine & *Homer* venit (u) *Germ.* der Nabel. Aliis *Vmbilicalis funiculus* dicitur, *Lauremb. l.c.* quod nomen sc. tam diu saltem retinet, quamdiu fetui adhæret: quale & illud est, quo *intestinum umbilicale* audit *Varolio* (vv) Aliis *chorda umbilicalis*, ut *Fabr. Hildano* (x) & Germanis *die Nabelschnur*.

(t) anat. corp. hum. Exerc. iv. p. 105.

(u) Iliad. λ

(vv) Anat. l. 4, c. 5.

(x) cent. 1. obs. 50 p. 210. & p. 212.

(y) Schol. part. p. 78.

(z) de appell. part. corp. hum. l. 1, c. xi.

(aa) Syntagm. Anat. c. 8.

(bb) Anat. contract. l. 2, part. 1, c. 19.

(cc) de cord. alloq. ad Lector. p. 47.

(dd) Inst. Anat. p. 146.

(ee) l. de dissect. vulv. cap. ult. ad fin.

(ff) tetra-bibl. 4. serm. 4, c. 3

Hinc *Paronymicè* tota media abdominis regio, quæ superiori & inferiori contradistinguitur, *Umbilicalis* dicitur, teste *I. Th. Schenckio*. (y) Hinc etiam *vasa*, de quibus postea cap. III. quoniam per umbilicum tendunt, *umbilicalia*. Quinam à Græca voce *ἐξὀμφαλοι*, quinam *πνευμαλόμφαλοι* &c. ex seq. cap. VI. patefiet. Suum itidem inde nomen accipit umbilici pars media *ἀνθρώμφαλος* dicta, teste *Ruffo Ephesio* (z).

C A P. I I.

De Describtione agit, & quò referri debeat, exponit.

Sunt qui partem nostram, ut in *fetu* solùm observatur, definiunt, *Umbilicum* dicentes membranofum quoddam receptaculum, vel ductum, intestini ferè formam mentientem, per quem à fetu vena & arteriæ maternum ad uterum surgant, uti facit *Veslingius* [aa] *Blasius* (bb) *Iac. de Back*. (cc) *Deusing*. [dd] *Galenus* verò [ee] cum *Aëtio* [ff] & aliis, summam se umbilici essentiam comprehendisse putant, cum dicunt, umbilicum nil esse aliud, quàm quatuor vasa, in medio sui urachum appellatum habentia, quæ describtio an firmâ nitatur hypothesis, seq. cap. docebit. Alii contra, ut in *adulto* homine sese videndum exhibet, describunt, quos inter est

est *Lauremberg*. [gg] umbilicum eam esse abdominis particulam ,
quæ partim prominula , partim hiulca esse cernitur , adnexum
habens fasciculum diversorum vasorum , transmissorum à Visceri-
bus ad superficiem corporis. Brevius ita ejus descriptionem absol-
vit *Ruf. Ephesius l. c.* Ventrís media pars *ὀμφαλὸς* umbilicus est ,
venarum per quas infans alitur , segmentum. Nobis verò cum u-
troque modo considerandus veniat , communem etiam utrique
cudamus definitionem , hanc scilicet : Umbilicus est pars corpo-
ris humani dissimilaris , in medio abdominis , immò totius cor-
poris sita, è semine & sanguine materno in utero orta , constans mem-
branâ quodammodo carnosâ & vasis umbilicalibus , fetui cum pla-
centâ & membranis involventibus , nutritionis gratiâ, continuis
ab eodem verò post exclusionem separatis , ubi relictâ hiulcâ &
prominulâ portiunculâ , interiora versus in ligamenta abit. Ali-
quantò quidem prolixior est hæc descriptio , quod tamen , ut suf-
ficienter ab aliis distingueretur partibus aliter vix à me fieri potuit.
Dixi ergò , ut majorem Definitioni lucem affundam , umbilicum
esse *partem* ; quod nemini , quid pars sit gnato , ignotum esse po-
test : Et quidem *dissimilarem* , ut intelligatur sc. nos non solam il-
lam membranam vasa involventem , quæ similis pars est , de-
scribere , sed & cum membrana contenta simul omnia , sive *ἰσχυρίαι*
illa sint , ut membrana dicta & vasa ; sive *ἰσχυόμενα* , ut sanguis cum
reliquo succo nutritio , sive *ἐνοσμούλαι* , ut spiritus. Per *corpus hu-*
manum , cujus partem esse diximus , si de embryo vel fetu sermo
sit , non intellectum volumus *corpus* vel *uterum maternum* , contra
Cornacem , qui ap. *Ioh. Schenckium* (hh) arterias umbilicales ma-
tri tribuit , sed *fetûs* : quoniam secundinæ non uteri , sed fetûs ,
à quo nutriuntur & augmentantur , partes censendæ , juxta *Har-*
veum (ii) & *Back l. c.* Cum verò fetus partes alias habeat in partu
deciduas , alias post partum *permanentes* , uti cum aliis *Vesling. l. c.*
dividit ; ad illas referendus est umbilicus , utpotè unâ cum suis
vasis post exclusionem statim maximâ ex parte resecandus.
Causarum quarum meminimus , unam *efficientem* , *semen* fecimus ,
cum insito sibi contagio spirituosio : sive solum deinde virile ad-
mittas cum *Aristotele* , *Harveo* , & *Affectis* recentioribus ; sive u-
trumque , & virile & muliebre cum veterum & recentiorum mul-
tis , nobis perinde erit , nec nostram faciamus litem. Altera ,
quam

(hh) l. 4.
obs. 181. p.
m. 431.

(ii) degen.
anim. p.
377.

quam attulimus , causa *materialis* est , *sanguis* sc. *maternus* , non excluso illo , quem veteres malè sudorem fetûs & urinam putarunt, colliquamento , intra chorion & amnion contento. De reliquis ad *Differentiam* nostræ definitionis concurrentibus fusiùs agent seqq. capita : quorum

C A P. III.

Substantiam & partes componen- tes, inprimis verò vasa fetûs umbili- calia considerabit.

Communis est umbilico & membranis substantia in fetu , si sc. per umbilicum eam intelligas tunicam , quæ reliqua vasa involvit Hinc *Bartholinus* l. c. dicit , quòd vasa umbilicalia integantur & obvelentur communi quadam *Tunicâ* , vel quasi crustâ, quam alii vocant intestinulum, funiculum, laqueum &c. Interim tamen non simplex planè est illa membrana , sed *carne* quodammodo *investita* , membraneus inde ac quodammodo *carnosus* ductus *Deusingio* l. c. dicta. Et quia processus esse videtur peritonæi, hinc quod aliis in enumeratione partium , ex quibus constat umbilicus, membrana est , illud peritonæum vocat l. Th. *Schenck*. (kk) quam cute insuper superinductam esse ib. ait. Quæ cutis umbilicum ambiens , quoniam corrugata senectutem significat , γρηῖα *Verula* appellatur , quod obiter ex *Ruff. Ephesio* l. c. annotare libuit. Debuir sc. instructa esse tantâ crassitie hæc membrana , quæ *Aristoteli* κέλυσος *Septuaginta*, teste *Riolano* (ll) ne vasa , quæ complectitur , invicem implicentur , rumpantur , aut alio modo lædantur , *Bartholin.* (mm) Meritò itaque invasa hæc , quibus tam benè prospexit Natura , penitiùs inquiramus , præsertim cùm ex iis tota umbilici compages contexta sit , quibus cognitis , & ipse per se innotescit. Intricatio verò cùm sit hæc materia , propter Magnos Auctores in diversas sententias abeuntis ; tutiùs nos acturos putamus , si nuda horum animi sensa proferamus , tamdiu suo quemque iudicio abundare concedentes , donec & nobis ipsis aliquando tam beatis esse liceat , ocularem horum , quæ dicun-

(kk) Sch.
part. p. 78.

(ll) l. c. p.
322.

(mm) A.
R. p. 198.

dicuntur , habere inspectionem ; & ex eâ demum , quæ veritati maximè sint consentanea , colligere.

Quando in conformationis ordine suum indispiscantur *ortum* Vasa umbilicalia , non conveniunt Auctores. Qui partes omnes spermaticas (sic dictas à suis Patronis , quòd semen illis materiam præbere credant , licet minùs rectè :) simul in utero delineari volunt , nec his nostris vasis diversum à reliquis partibus ortûs principium ponunt. Cum quibus è Recentioribus m. facit *Courvaux* (nn) : Qui tamen non satis sibi ipsi constare videtur , dum l. c. (oo) disertè docet , non simul cum reliquis , sed post hepar demum emergere , dicens : Primùm conspicitur sanguis in corde , tùm paulò inferiùs per venam descendendo concrescit , constituitque hepar , quo constituto [inquit] emergunt & propagantur vasa una cum sanguine , qui concretus format placentam extra puerum . Aliter sentit *Galenus* (pp) asserens , post membranas fetum involventes primò generari venas arteriasque (umbilicales puta , nam reliquas demum post tria principalia viscera , cor , cerebrum & hepar , oriri statuit (qq)] ex eâ ratione , quòd pro generatione partium fetûs reliquarum opus sit sanguine & spiritu , quem scil. excipere putat venas has ex utero materno : in quâ vero ortûs ratione hallucinari videtur *Deusingio* (rr) ut etiam ex seqq. patebit. Immò verò sanguinem primò , & eodem ferè tempore vasa & organa , venas np. umbilicales & vesículas pulsantes ante alia omnia constitui se credere dicit perspicacissimus Naturæ Perscrutator *Harveus* . (ss) Sanguis enim necessariò in vasis continetur , ac propter eâ (ut *Aristoteles* observavit) meatus duo venales statim ab initio cernuntur , qui postea vasa umbilicalia constituunt , *Id. ib. p. 207.* quod (tt) repetit , dicens : Venæ umbilicales multò ante conspicuæ sunt , quàm quidpiam corporis inchoatur. Nihilominùs hoc à vero recedere dicit *Veslingius l. c.* & arterias venamque ante cor & jecur produci negat. Neque enim utrumque viscus ex sanguine , sed ex semine primùm vult constitui. Immò , ait , totius corpusculi systema priùs componitur , quàm ex eo vasa protendantur. Horum enim , *ratiocinatur* , ante constituta viscera nullus est usus , ut conceptus animantium & stirpium semina clarissimè demonstrent. Adstipulatur *Veslingio Everardus* , (uu) nonne foret absurdum , ajens , venam arteriasque umbilicales , quia primùm in

(nn) part.
2. de nutr.
fet. c. 10. p.
123.

(oo) p. l. c.
12. pag. 55.

(pp) l. 15.
de V. P. c.
4. & de
form. fet.
c. 2. & 3. it.
l. 1. de sem.
c. 13. & ali-
bi.

(qq) l. 1. de
sem. c. 8.

(rr) de gen
fet. in ut.
p. 90.

(ss) de gen
an Exerc.
54. p. 223.

(tt) Exerc.
55. p. 234.

(uu) in no-
vo homin.
brutique
exortu p.
197.

conspicuum veniunt ; statuere fundamentum totius corporis, hisque partes alias accrescere , cum arterias umbilicales ab arteriis Iliacis, & Iliacas à corde procedere sit certissimum? Suum qq. calculum adjicit *Deusing.* (vv) probans, nequaquam partium primas, sed demum post cor & jecur constituta produci. Longius vero quam par est, (xx) Fund, extendere videtur horum exortum *CL. Mæbius*, qui (xx) vult, non nisi Phys. p. in fetu formato ea conspici , cum tamen vel ipsi nos , Duce Spe- 164. *tabilissimo atque Amplissimo Dn. D. Præside , Patrono & Præceptore nostro jugiter venerando* , viderimus in embryo mensis præter propter unius , per abortum rejecto , artubus suis adhuc destituto , umbilicum nihilominus notabilis jam magnitudinis & crassitie, in placenta porrigi. Nisi forsan in eo excusandum ducas *Excellentissimum Mæbium* , quod fetum formatum eum dixerit , quem alii *de-lineatum* , in primis sc. staminibus.

Hæc de ortûs tempore. Quid de ortûs loco, vel termino à quo suam ducant originem umbilicalia vasa , sentiendum sit, nunc itidem ex probatis proponamus Auctoribus? Qui sanguinem & spiritus ex utero materno immediatè , nutritionis & vitalitatis gratiâ in fetum derivari autumant , plerique etiam cum *Vesalio* & *Columbo* vasorum umbilicalium *πρωτῶν* principium in utero materno (yy) l. xv, ponunt. Hinc *Galenus* (yy) dicit. Quot sunt orificia vasorum de V. P. c. 4 in uteri cavitatem hiantium , tot sunt initia vasorum fetûs. Ita sc. ut Auctore *Aëtio* (zz) ab unoquoque osculo in uterum aperto (zz) tetra- vas generetur : ab osculo arteriæ , arteria ; à venæ osculo , vena. 4. serm. 4. Verùm , præter id , quod *Galenus* hac in parte ipse à seipso dissen- c. 3. tiat , quando (a) inquit, velut plantæ duplicem exortum è semini- (a) l. de sem. c. 9. bus emittunt , sursum truncum & ramos emittentes , deorsum radices diffundentes ; ita in fetibus venas & arterias in totum corpus trunci ramorumque instar dispertiri , in vulvam ut radices desinere : vel idèd hæc sententia admitti vix potest, quod teste *Γαλιῆνῳ* C. *Hoffmanno* , (b) sensus doceat , non esse proportionem inter orificia uteri, & innumeras umbilicalium radificationes : unde igitur Gal. l. xv. initium habebunt illæ, quibus in utero nullæ respondent? Præter- de V. P. eà , ut cum aliis *Id. ib.* testatur, sensus etiam docet , vasa umbilicalia non penetrare se in intimam uteri substantiam, sed adhærere tantum parieti extimo : quomodo ergò vasa inde sunt? Anastomôses quidem varias vasorum umbilicalium *αὐτῶν* notavit *Bartholinus* [c] dum modò

modò ramuli venarum & arteriarum se transcendunt crucis in mœ-
rem, tam internè quam externè; modò per insertionem junguntur,
modò ad latera congregiuntur, modò cochleari figurâ intorquentur:
Minimi vasorum ramuli in majores compinguntur &c. sed intra
placentam hæc tantum modò fiunt cum se ipsis invicem, ut promptus
sc. esset transitus recurrentis sanguinis ex arterioli ad venulas; non
verò cum uterinis. Immodò ex abundanti manifestè redarguit vasorum
ab utero ortum *arteriarum pulsus*, quem à matris rythmo diversum
obtinet fetus: quod faciliè experiri licet, si manum alteram carpo
matris, alteram umbilici funiculo admooveris, ait *Nobilissimus Harveus*
(d). Et quanta, quæso, doloris exasperatio contingeret in partu, cum
necessum foret, illa tunc temporis dirumpi? Majorem ergò me-
rentur assensum, qui ex ipso fetu hæc vasa oriri statuunt, quod cum
Aristotele (e) *C. Hofmann. l.c.* & communiter illi omnes, qui sangui-
nem non ex matre attrahi, sed in fetu generari asserunt. Cognitò ita-
que principio ortus, *insertio vel terminus ad quem* faciliè patet ex
opposito, in *placentam* enim ramuli umbilicales, ceu radices in terram
sparguntur, ut loqui amat *Harveus* (f) & *Deusing. l.c.*

(d) l. c. p.
376.

(e) 2. Gen.
7.

(f) l. c. p.
237.

Pergamus ad determinandum vasorum umbilicalium *numerum*,
de quo itidem litigant Anatomici. Nonnulli enim *tria* tantum ad-
mittunt, ut *Riolanus l.c.* venam, arteriam, & urachum: licet non
neget, quandoque adesse geminas arterias. Alii contra geminas ar-
terias quidem & unicam venam; urachum v. negant, de quibus p.p.
Qui *quatuor* statuunt, vel duas ponunt venas, duasque arterias, ut
Galenus & *Aëtius l.c.* qui vasa per secundam dispersa rursus inter se
coite dicit, & in duos veluti stipites desinere, binasque venas & bi-
nas arterias perficere: vel unam faciunt venam, duas arterias & ura-
chum, ut *Rejes* (g) *Deusing.* (h) cum multis aliis. *Quinque* nume-
rant, qui concedunt & urachum, & binas arterias, sed & duas fa-
ciunt venas: ita *Galenus* (i) umbilicum nihil aliud esse ait, quàm
quatuor dicta vasa, in medio urinaculum habentia: quo cum facit
Mæbius (k) Eundem *quinarium* numerum servant, qui in locum alte-
rius venæ tunicam involventem substituunt, quod facit *Lauremberg.*
(l) *Back.* [m] Ad *majorem* assurgunt *numerum*, qui hactenus enu-
meratis *nervos* addunt, *vasa lymphatica* & *venas lacteas*, quod cum *Re-*
centioribus nonnullis vult l. Th. *Schenck.* [n].

(g) camp.
Elyf. juc.
quæst. c. 11.
(h) l. c. p.
149.

(i) de dis-
sect. vulv.
cap. ult.

(k) l. M. l.
l. c. 4. p. 12.

(l) Exerc.
iv. p. 106.

(m) l. c. p.
47.

(n) Sch. p.
l. v. p. 1. c. 1.
p. 116.

Nos ut ordine procedamus, quid in singulorum historiâ obser-

- vandum sit, proponamus; initium facientes ab *arteriis*: quarum *nū-mero dua* sunt, communi ferè Auctorum consensu, si solum forsàn exceperis *Riolanum*, qui [o] vult arterias extra chorion, perinde ac venas, in *unum* sui generis vasculum coire; licet deinde concedat, arteriam in ventrem ingressam statim in *duas* dirimi. Hi duo verò trunci ulterius deinde dividuntur, ita ut sensim multiplicati plurimis tandem & minutissimis ramulis in chorion, & placentam radificentur, teste *Lauremb.* (p) & *Aquapend.* (q): Licet hic hæc proferat inverso ordine, principium ortus ponens uterum, vel ramulos illos minutos; sed, ut supra monuimus, minùs rectè: nam censente *ingeniosissimo Harveo* [r] rami trunci sui principium non dicuntur: sed ubi truncus earum maximus reperitur, ibidem qq. ut venarum, ita & arteriarum principium censendum est. Præsupposito itaque generali *ortus principio*, quod fetus est, ab hujus arteriæ magnæ descendentes *ramis Iliacis* interiùs *pro- tendi* arterias nostras, dicimus utrinque sc. ad latera vesicæ; uti fatentur cum *Deusingio*. [s] tantum non omnes. Nisi quòd *Kerckringius* (t) eas aliquando viderit per Naturæ lum- sum, duobus transversis digitis ab aortæ extremitate initium sum- fisse. Quòd verò hinc, & non ab ipso Corde immediatè suum tra- hant ortum, *Galenus l. c.* idèd fieri dicit, ne sc. in isto longiore ductu pendulæ periclitarentur: præstitit itaque eas ad hypogastricas deduci, quia in isto itinere vesicæ lateribus incumbentes ab omni læsione se- curæ sunt. Aliam reddit rationem *Harveus* (u), quòd sc. sint vasa minùs principalia, inferioris ordinis atque usùs, ut etiam magnitudi- nis. Hincque est, quòd idem Auctor (vv) faciliùs sibi persuadeat, arterias has umbilicales *post venas* cognomines demùm *oriri*: cùm vix probabile sit, eas priùs quàm pars corporis (unde oriuntur) constitu- ta sit, existere. Quà in sententiâ eò magis firmatur, quòd *lynceo* suo oculo primis mensibus illas reperire non potuerit. Idem prætereà evincere videtur earum *usus*, qui posterior est usu venarum; per has enim reverà movetur alimentarius succus ad cor, antequam arteriæ cum venis concurrant: neque à corde aliquid propelli potest, nisi prius aliquid à corde fuerit admissum, ait *Deusing.* (x) qui adèd ne- quaquàm admittendam esse censet sententiam *Charltonis* (y) con- tendentis, arterias totas effingi, antequàm exortus fiat initium: quasi sanguis ipse ad libitum per arterias exspatiatus, cùm nequeat per eosdem canales ad centrum remeare, ob novos fluctus, noviter à
- centro
- (o) l. c. p. 328.
- (p) l. c. p. 107.
- (q) de fet. form. p. 1. c. 2.
- (r) l. c. p. 374.
- (s) l. A. p. 149.
- (t) anat. obs. 37.
- (u) l. c. p. 377.
- (vv) l. c. p. 230, 234.
- (x) cur. sec. p. 304.
- (y) Exerc. de sanguif

centro affluentes , prioresque à tergo impellentes , in reditu demum sibi ipse novos ductus efformet, venasque effingat, per quas revertatur.

Quid de *insertione arteriarum* tenendum sit, ex iis, quæ de vasis umbilicalibus in genere diximus , haberi potest , melius sc. eos facere, qui *terminum ad quem* porriguntur , *placentam* faciunt : licet non omnes arteriæ eò vergant, sed plurimæ *chorion* etiam illustrent, & in eo numerosis radicibus spargantur , uti observavit *Riolanus* (z) & *I. Th. Schenck*. [aa] Tendunt v. ad hosce terminos arteriæ umbilicales , dum à ramis Iliacis ortum trahentes , ad urachi latera sursum porrectæ , umbilicum ingrediuntur , venamque mediam utrinque comitantur, teste *Veslingio l. c. Deusing*. (bb) Immo ultimis suis staminibus venæ huic tam arctè cohærent, ut ejus propaginum tunicis attexantur planè, vel potius in tunicas venarum obscurè repant, & ibidem oblitterentur, notante *Harveo* (cc).

Si *quantitatem* porrò *arteriarum umbilicalium* consideremus , alia est ea in fetu *imperfecto*, alia in *perfecto* & jam formato. Sub initiis enim inconspiciuæ sunt , utpote exiles adeò , ut iis inveniendis lynceis oculis opus sit, observante *Harveo* (dd). Crescente v. Embryo, & ipsæ subinde majorem acquirunt quantitatem, suâque semper *longitudine* respondent toti umbilicali funiculo (de cujus quantitate seq. cap.) licet minores *crassitie* sint ipsâ venâ. Pusilli illi arteriarum ramuli , quoniam , quantum saltem oculis constat , non pulsant , idcirco à venis internosci tunc temporis nequeunt: postea v. non nsp. pulsû ab iisdem distinguuntur, auctore *Harveo l. c.* quem *eod.* teste p. 376. non à matris, sed proprii cordis virtute habent, uti *rythmus* utriusque diversus satis docet. Vt adeò *usus* arteriis hisce à Veterum Anatomicorum plerisque adscriptus, tanquam infirmo nixus fundamento, cadere necesse habeat. Non enim sanguinem & spiritum per arterias uterinas immediatè excipiunt , vel secundum *Riolanum l. c.* ex eodem in placentam confusè excepto proprium sibi que familiarum attrahunt, & ita sanguinem puriorem & spirituosum fetui prospiciunt, qui roboret, vegetet, atque perficiat omnes ejus naturales vitalesque operationes: sed potius contrario modo sanguinis arteriosi partem in nutritione fetûs superfluam per Iliacos duos ramos in placentam & Chorion reducant , *partim* ut ulterius ibidem coquatur , & benefica fiat alimentarii à matre affluentis succi in hepate uterino cum residuo sanguine miscella , secundum *Mæbium* (ee) & *Deu-*

(z) l. c. p.
327. 328.
(aa) l. c. p.
120.

(bb) l. A.
p. 149

(cc) l. c. p.
373. & de
Circ. sang.
Exerc. 11. p.
m. 207.
(dd) de
Gen. an. p.
373.

(ee) l. c. p.
364.

- (ff) I. A. p. ^{150.} *sing.* (ff) *partim* ut extraneis fetûs partibus seu secundinis nutritium humorem advehant, juxta *Back.* (gg) Et hoc quidem tûm nobilissimum *Harvei* inventum, sanguinis circulatio postulat; cujus lege omnis arteria sanguinem à corde abducit; tum fetus ipse, qui propriâ vitâ fruitur, evincit: cum enim sibi ipsi sanguinem præparet, ipse etiam arterias habebit pulsantes ac sanguine & spiritibus plenas, diu antequam conceptus (in quo efformatur & natat) utero alligatur, uti observavit *Nobilissimus Harveus* (hh) Quin immò *Idem* jam extincta matre & planè rigidâ, in caesonibus sæpè reperit arterias umbilicales micantes, fetumque vegetum: qualem, si materno tunc aleretur sanguine, & viveret spiritu, quis sibi fingere posset? Præterea motum hunc à nobis indigitatum alio sat certo experimento probatum dedit *Bartholinus* (ii). Digito namque sæpè turgida vasa pressit, observavitque, facilè adigi sanguinem ex arteria in placentam. *Idem* in ligaturis manifestum est. Ligatis enim arteriis umbilicalibus fetûs vivi, adhuc matre vivente adhærentis, observavit *Waleus*, immò jam ante *Walzum Galenus* ipse [kk] & post eum alii pulsationem illarum intra ligaturam & fetum, nullum verò pulsus intra ligaturam & uterum matris. Fit hoc propter *valvulas*, quibus arteria dotata est, juxta *Courvaum* (ll) quasque observavit *Hoboken.* (mm) in arteriis radici umbilici adhærere. Vt ita satis falsa appareat Veterum hac de re opinio: quâ vix mitiorem meretur animadversionem alter ille usus à *Fabr. ab Aquapend.* (nn) & *Cornace* ap. *Ioh. Schenk.* (oo) arteriis umbilicalibus adsignatus, *caloris* sc. *conservatio*, quæ fiat *refrigeratione*. Nam ut *Harvei* verbis (pp) utar; si pulsus arteriarum partes corporis refrigerant, & eventant, quî pulmones ipsum cor? quomodo dicunt vulgo arterias, à corde in partes singulas vitalem sanguinem deferre refertissimum spiritibus vitalibus, qui partium calorem foveant, sopitum suscitent, & qs. absumtum resarciant? Quomodo (si ligaveris arterias) statim partes non modò torpent, frigent, & qs. pallidæ cernuntur, sed & ali tandem desinunt; quod secundum *Galenum* contingit, quia calore, qui per omnes partes superne à corde confluerat, privatae sint. Patet ergò hinc, magis arterias calorem partibus deferre quam refrigerium.
- Progredimur ad *venam umbilicalem*. Quam *triplicem* ex uno hepate uterino vidit *Beslerus* [qq]: Multi *duplicem* dicunt cum *Galeno* [rr]: quod inde fit, quia interdum geminata est, & in duos ramos divisa

divisa, uti docet *Bartholinus* (ss). Et duas dici posse antequam per umbilici putamen copulentur, non debet petulantius negari, ait *C. Hofmannus* [tt]. Hinc, exortu retrogrado innumeras pro- pmodum & minutas venulas mutuò semper uniri, & majores sub- inde fieri, dicit *Aquapend.* [uu] neque cessare mutuam earum coi- tionem, donec ex omnibus duo magni trunci resularint, quæ fetus umbilicum penetrantes, in unicum grandem tandem desinant.

Huc accedit, quòd interdum gemina etiam in hepatis fissu- ram juxta observationem *Riolani* (vv) insinuat, vel potius ortum inde ducat. Aliàs *unica* tantum est ordinariè, licet, ut arteriæ, ramis furculisque plurimis etiam diremta. Et in hoc, si res ad infantis um- bilicum solum spectet, *Galenus* consentit, expressè, ajens, eas in in- fante coire *unamq;* effici, teste *Commentatore ejus fidelissimo C. Hofman- no l. c.* Vnitatis hujus rationem hanc dat *Galenus* : quia vena debe- bat ferri sublimis, fortior est facta conjunctione duarum, securitatis gratià : tum etiam vena uni parti infigi debebat, quod in arteriis non erat necesse.

Origine suâ hæc vena arterias prævertit, ut supra diduximus. Et *Riolanus* (xx) venam umbilicalem, etiam in suo genere, ortu ac generatione omnium *primam* censet ; ab eâque reliquas propagari scribit etiam *Galenus* [yy] Verisimilius tamen est, majora primùm vasa, quale in hoc genere vena cava est; oriri, reliquisque demum, ut minoribus, suam dare originem, utpote propiora cordi, primo sui ortus promocondo. Nisi forsan cum *Barthol.* [zz] velis dicere, pri- mò omnium ante alias venas productam esse nostram hanc, ratione perfectionis : quia sc. nutrimentum reliquis subministrare debebat. Aliàs *Galenus* ille *Altorfinus C. Hofmannus* (a) venas umbilicales de- mum, cum instat tempus *αὐξησις* à venâ cavâ produci credit. In hanc enim nostra umbilicalis vena prope dextram cordis auriculam desinit; jecurque permeans in Portam perforatur, nullasque prætereà propagines de se spargit, donec è gibbâ jecoris parte prodeat, orificio satis amplo. Adèò ut apertâ venâ cavâ ab auricula cordis deorsum ver- sus, sanguineque omni depleta, orificia tria qs. simul juncta conspi- cari liceat : quorum unum venæ cavæ descendens est introitus ; al- terum rami jecorarii per totam hepatis gibbam disseminati, exitus : tertium autem *venæ istius umbilicalis origo* : uti pulchrè observavit in hoc negotio curiosissimus *Harveus* (b) Vt ergò frustra sint, qui, ut o-

(ss) A. R. p. 199.
(tt) Com. in Gal. xv. de V. P. 4.
(uu) l. c. c. 2

(vv) l. c. p. 328.

(xx) l. c. p. 240.
(yy) l. de form. fet. c. 3.

(zz) A. R. p. 198.

(a) l. c. p. 337. a.

(b) l. c. p. 374.

mnium, ita & nostræ venæ originem in hepate quarunt: siquidem tota secur pertransit, ut oculatissimi observarunt Anatomici. Interdum tamen, quod lusui Naturæ tribuendum est, exortus principia variant. Ita duo venæ hujus principia, unum sc. à venâ cavâ, alterum

(c) anat. à vena portæ observavit *Dominic. Marchette* (c) *Theod. Kerckring*. v. c. 8.
(d) anat. [d] venarum umbilicalium unam ex hepate, alteram ex vena mesarai-
obl. 37. ca prodeuntem vidit. Quod etiam sæpius accidisse *Needam* (e) scribit.

(e) c. 4. de Dum v. ita ex hepate per fissuram partis cavæ peculiarem e-
vas. umbi. mergit, fertur porrò deorsum, umbilicum versus, inde progressa in-
lic. p. 105. ter arterias media ascendit varicoso flexu ad secundinas usque, pluri-
mos ramos super chorion spargens: tenuissimis tandem capillamen-
(f) l. A. p. tis in Placenta terminatur, Auctore *Deuslingio* [f] immò extrema-
149. tibus suis planè ad ora arteriarum uterinarum approximare vult I. Th.
(g) l. c. p. *Schenck*. [g] quamvis *Harveus* (h) oculari observatione nixus omne
119. venarum commercium, & cum vasis uterinis anastomosis excludat.
(h) l. c. Ex- Observavit v. p. 309. in cervæ fetu in carunculas quasdam, quas co-
erc. 69. p. tyledones vel acetabula veterum putat, albâ & mucilaginosâ mate-
309. & 372. riâ refertas, plurimos surculos sive capillares vasorum umbilicalium
ramusculos desinere, & extrahi quemadmodum herbas è terra evul-
sas, radices suæ comitantur.

(i) Anat. *longitudine* totî funiculo respondet; *amplitudine* verò superat arterias,
secund. art. iisque multò laxior est, *Hoboken*. (i) & initio [puta, ut *Riolanus* (k)
6. s. 2. art. illud describit, retrogrado à placenta factò] latior, sub finem angustior.
9. s. 6.

A reliquis corporis partibus, quæ primis mensibus omnes albicant,
(k) l. c. 329. colore solæ hæ venæ distinguuntur, *rubicundo* sc. à sanguine quem ve-
(l) l. c. p. 234 hunt, secundum *Harveum* [l], si quidem vasorum umbilicalium ra-
mulus est illa linea purpurascens, & non potius, ut *Deusling*. (m) cen-
(m) cur. set, colliquamentum ipsum, vi caloris externi agitantis, strias pur-
sec. p. 290. purascentes agens, atque ita sanguineum colorem induens. Cæterum
(n) fund. in reliquâ venæ hujus structurâ nequaquam prætereundi sunt *nodi* illi
Phyf. p. in eâ se exerentes: qui licet à multis ad umbilici totius funiculum,
564.

& ab *Hobokeno* l. c. ad arterias referantur, *venæ* tamen huic *propri* vi-
(o) l. c. p. dentur, testibus *Mæb*. (n) I. Th. *Schenck*. (o) *Harveo* [p] & c. Planè
119. quidem à *Veslingio* [q] negantur, contra plurimorum tamen Ana-
(p) l. c. p. tomicorum autopsiam. Nonnullos esse dicit *Bartholin*. (r), eodem
375. tamen numero non semper in omnibus enixis inveniuntur, nec etiam
(q) Synt. in eadem parturiente, cum sæpius jam plures, jam pauciores notentur,
amat. c. 5.

(r) l. c. p. auctore
198.

auctore *Rejes* (s) qui (t) cum *Cardano* (u) dicendum esse censet, secundos uteros plerumq; plures nodos parere in umbilico, steriles v. paucos, nec ad unguem distinctos: idque idèd, quia cum majori sanguinis copiâ abundant, ex eo etiam facilius concipiant, & ipsi nodi quædam sanguinis ad ipsos confluentis sint receptacula, in quibus magis elaboratur; imò quò plures sint, sanguinis abundantiam denotent, & ad concipiendum & prolem generandam majorem aptitudinem. Putat quidem *P. Pavvius* (v) nodos illos nil nisi reduplicaciones esse venarum & artèriarum inter se h. e. venas & artèrias iis locis convolvi. Meliùs tamen *Deusing* (x) dicit, eosdem varices esse inclusæ venæ, juxta valvulas ejusdem sitas, ac carnosiores quodammodò & protuberantiores membranæ carnosæ in eadem regione partes: consentit *Barthol.* (y) *J. Th. Schenck. Moeb. Harveus l. c. & alii.* Cautum nim. est hac arte à Naturâ, ne confertim sanguis ad fetum refluat, ut cum *Harv. l. c.* sentit *Barthol. l. c.* addens, veluti cochleari ab iis hauriri sanguinem in itinere longiori, paulatimque sisti, ut ita diutiùs elaboretur. Accedit tertius usus, quem præter *Bartholin.* etiam *Riolan.* (z) ei assignat, nodos sc. hos fortiora reddere vasa, & ad robur distinguere umbilicum, ne in tantâ longitudine ruptioni esset obnoxius. Quid v. de prognosi illâ ex nodis de puerperiis futuris sentiendum sit, Cap. VII. videbimus. Pater hinc hanc venam aut peculiaribus instructam esse *valvulis*, quas prope placentam observavit *Hoboken. l. c.* aut nodulos hos eorum officio fungi, qui prohibeant, ut retrò fluat sanguis: quod confirmat *Excell. Bartholini* observatio (aa): faciliè enim sanguinem in venis placenta contentum digito vel instrumento versus truncum s. funem ipsum adegit: non item versus placentam. Cadit ergò suâ sponte usus à *Courvaø* (bb) huic venæ tributus, putat enim expelli per eam à fetu sanguinem jam confectum, & ad placentam ultimis mensibus derivari: quod v. præter dictas valvulas, etiam ipsa communis circulatio, sine quâ cordis motus vigere vel continuari non potest, & ad quam ipse (cc) provocat, infringit. Nec videtur admittenda *Coiteri* sententia (dd), qui, quòd in Virgine dissecta venam umbilicalem sanguine turgidam invenit, putavit factum id esse à Naturâ, ut venis portæ in sanguinis elaboratione adjumenti parum afferret; nam præter id, quòd aliquid p. n. ibi adfuerit, etiam hypothesis, quæ venæ portæ sanguificationem tribuit, falsa est. Idem dicendum de eâ opinione, quam dictus Auctor quosdam Anatomicos, qui eadem cum ipso observarint,

(s) l. c. p. 661.

(t) seq. p. 664.

(u) l. 8. de rer. var. c. 44.

(v) obs. anat. i.

(x) l. A. p. 148.

(y) l. c. p. 199.

(z) l. c. p. 331

(aa) l. c. p. 196.

(bb) l. c. p. 1. c. 12. p. 55.

(cc) l. c. p. 2. c. 12.

(dd) libell. obs. anat. & chirurg.

fovere dicit, quòd sc. *lecinatoris vicem gerat*. Qui v. idèò conditam hanc venam credunt, ut *per illam nutrimentum fœtui adducatur*, non ita intelligant necesse est, ac si veherent alimentum jam actu tale, sed succum demum in alimentum verum mutandum. Scilicet umbilicalis vena recipit sanguinem, qui per arterias umbilicales à corde in secundas effusus, in earum nutrimentum absumtus non est: & cum hoc ipso sanguine alimentarium illum humorem, qui à matre affluens vel in placenta uterinâ, vel intra conceptus membranas ambientes continetur, unâ devehit ad cor fœtus, ab hoc ipso demum coquendum & elaborandum, atque in ultimum vereque vitale alimentum facultate fœtui insitâ, redigendum: Consentientes habeo *Deus. (ee) Harveum* (ff) *Moeb. l.c. Back.* (gg) Quæ de venæ hujus statu p.n. nunc dici possent, reservamus ad Cap. VI. Pedem ulterius promoventes ad tertium vasorum umbilicalium genus, *urachum* communiter; *Actio v. l.c. uragum, urinaculum* Latinè *Fabr. Aquapend.* (hh) dictum, inter magni nominis Auctores tam quoad existentiam, quàm substantiam & usum maximè controversum. *Negat* omninò *urachum* aliquem existere in fœtu humano *Arantius*, propter exiguitatem, uti vult *Aquapend. l.c.* qui idcirco erroris eum postulat: in quo tamen, si quidem talis dicendus sit, & ipse *Harveus* (ii) sese versari ultro profitetur. Nunquam enim se conspicatum esse *urachum* testatur. Vidit quidem in ovibus & cervis inter arterias umbilicales quasi vesicæ processum quendam, urinam in se complectentem: non a. qualis *urachus* ab *Aquapendente* describitur. Similem exiguam eminentiam infra fundum vesicæ observavit *P. Pavvius obs. an. 1.* quæ minimi digiti crassitiem in longitudine non æquabat: *urachum* v. umbilico affixum nullum. *Rud. Salzmannus, Med. Prof. ap. Argentinenses quondam celeberrimus* (kk) in infante 7. Septimanarum ne vestigium quidem *urachi* in ipsâ vesicâ invenit. Quod & bis observavit *Hoboken* (ll) *assertores* v. *urachi* cum *Galeno* definiunt, quòd sit meatus, qui à fundo Vesicæ ipsius exortus, medius incedat inter duas arterias duasque venas umbilicum constituentes, quoad umbilicum prætergressus lotium in tunicam *αλαντοειδῆ* derivet, si ad, est, alioquin in chorium eandem urinam transmittit. *Ortum* nim. suum *urachus*, sicubi adest, ducat à vesicâ, & ejus quidem fundo. *Aëtius l.c.* eundem principium pelliculæ farciminalis dicit, perforatumque esse ad fundum vesicæ ipsius fœtus; quod quidem de aliis animalibus magis verè, quàm de homine, dictum esse videtur: in hoc enim neque

far-

(ee) l. c. p.
284.

(ff) l. c. p.
252.

(gg) l. c. p.
48.

(hh) l. c. p.
14.

(ii) l. c. p.
359.

[kk] obs.
anat. 10.

Sept. 1601.

[ll] l. c. art.

6. §. 1. &

art. X. §. 5.

farciminalis illa pellicula datur, neque urachus in fundum vesicæ perforatur, sed à membranis ejusdem tantum oritur, teste *Deusing.* [mm] & *Riolano* (nn) Fertur hinc inter venam arteriasque umbilicales ad umbilicum, secundum *Lauremb.* [oo]: in cujus membranâ obliteratur, teste *de Back. l.c. p. 47.* *Quantitas* etgò ejus insignis esse nequit, siquidem *sec. Back. l.c. & Spigelii* (pp) dimensionem, non ultra trium transversorum digitorum longitudinem in adulto supra abdomen excurrit: & juxta *Barthol.* (qq) arteriâ dimidio minor est. Secundum *Dominic. de Marchette* (rr) ne quidem supra abdomen excurrit, sed intra abdomen fetûs manet. *Substantiam* ejus si consideres, duplici constat, ex *Riolani l.c.* animadversione, interiori nervosâ, ab interiori vesicæ tunica; exteriori magis membranosa, ab exteriori. Consentit *Deusing.* (ss) Corpusculum nervosum & membranosum vocans. An v. pervium sit in humano fetu hoc corpusculum, de eo magna est inter Anatomicos controversia. Pro affirmativâ parte stant cum *Galeno Ruff. Ephesius* (tt) *Aëtius l.c. Zac. Lusitan.* (uu) *Aquapend. Vestling. l.c. Spigelius &c.* Et *Laurentius* quidem [xx] hoc probare nititur duobus argumentis; (1) quia alioquin frustraneus esset: (2) quia visa est urina ejecta per umbilicum in adultâ puellâ. Juvit *Laurentium Rodericus à Castro* (yy) addens [3] quod per vesicam nequeat facere urinam fetus, ergò necessariò per urachum: (4) Si sublatis manu vasis umbilicalibus vesica prematur, effluere evidenter per urachum. *J. Th. Schenck.* (zz) porosum quidem etiam dicit, sed addit, quando talis deprehenditur, id potiùs conformationi ejus peculiari adscribendum, quæ licet tractu temporis in ligamenti duritiem abeat, ita tñ. occulta secum pororum ista vestigia gestet, ut exigente necessitate referari, & à sarcinâ aquarum vesicam partesque adnexas liberare valeat. Ejusmodi referati urachi exemplum habet *Fernelius* [a] & *Bartholinus* (b). Interim non malè facere ait, qui divortium ab *Aquap. & Spigel.* facientes, cum *Campo, Arantio, Cortesio, Riolano & aliis* pro funiculo & ligamento habeat Nam teste *Riolano l.c.* id autopsia docet, ubi sc. nullâ arte perforatus observari potuit, accedente hinc peritissimorum Anatomicorum consensu, *Fallopîi, Eustachii, Parai, Varolii, Th. Bartholini* (c) *Salzmänni l.c. & 24. Febr. 1608. & 9. Mart. 1614. Pavvii* (d) *Lauremb. (e) Bilsi* (f) *Rationibus* etiam demonstrari potest, ordinariè & naturaliter impervium esse urachum. Si namque usus, propter quem secundum affirmantium sententiam perforatus esse debebat, nullus est, & ipsa cavitas nulla erit, Urinam

[mm] l. a. p. 151.
[nn] l. c. p. 330.
[oo] l. c. p. 107.
[pp] l. c. c. 9
[qq] l. c. p. 204.
[rr] anat. c. 8. p. 83.
[ss] l. c. p. 151.
[tt] l. c. L. 1 c. 37.
[uu] l. c. l. vi. p. 945.
[xx] l. i. c. 9. & l. 8. q. 17.
[yy] l. i. de nat. mul. c. 10.
(zz) l. c. p. 121.
(a) l. 6. Pathol. c. 13.
(b) l. c. p. 205.
(c) cent. i. hist. 14.
(d) obs. 2. nat. i. 6. 17.
(e) l. c. p. 108.
(f) respons. ad Ep. Tob. Andreæ p. 7.

(g) l. c. p.
186.

(h) in not.
ad Vesl. c.
8.

(i) l. c. p.
238.

v. fetus, uti putant per illum non excerni, patet inde, quia vesica quocunque etiam mense grandiusculus dissecatur, urinâ semper plena ac distenta reperitur, uti ex *Everard.* (g) testatur *Blasius* (h) Ut aded non necesse videatur, urinam à fetu excerni, uti imaginatus sibi est *R. à Castro* in *Object.* 3. supr. allatâ. Inprimis cum in utero ob nutrimenti puritatem excrementa paucissima generentur, & vesica urinæ recipiendæ sufficiens videatur, sec. *Varol.* & *Moeb.* Hinc est quod puer genitus statim urinam & homerdam deponat, Quin & si per urachum urina excerneretur, humor ille, qui inter chorion & amnion continetur, urinæ deberet habere conditiones, quod tn. juxta *Everard.* l. c. non est. Et quis credat, tam pessimè consultum esse fetui tenerimo, ut tanto temporis spatio in humore tam salso & mordaci, vel in edito infante excoiationes causante, detineri cogatur? ut taceam, (quod 4. illam *R. à Castro* instantiam infringit) vesicam manu compressam urinam foràs per vesicæ collum, non autem per urachum profundere: quod sæpe se observasse testatur *fidelissimus suarum observationum propalator Harvej.* (i) Et qui quæso liquor ille posset esse fetus excrementum, cum jam adsit priusquam formetur embryo, nosque ipsi, præeunte *Hodogeta* studiorum nostrorum *fidelissimo*, *Excellentissimo Dn. Præside*, viderimus ejusmodi Embryum, vix fabæ majoris quantitatem excedens, nec ullo adhucdum, quantum nudis oculis observare licuit, sexus signo distinctum, quod tamen tantâ liquoris copiâ erat circumfusum, quæ vel adulto pro una vice per vesicam excernenda sufficeret. Et quod nostram magis confirmat sententiam, prope partum, ubi fetus grandior copiosiori alimento utitur, eoque nomine etiam plus excrementi accumulare deberet, aqua illa minori copiâ cernitur, quam primis prægnationis mensibus, teste nunquâ sine honoris titulo nominando *Dn. Harveol. c.* ut vel hinc pateat, potius illam absumi quàm reddi ab embryone. Nec ullius sunt momenti, quæ contra afferre nititur argumenta *Laurentius*: quod enim dicit, visam esse urinam per umbilicum puellæ excretam, videtur hoc aliis variis factum modis: vel propter urachum p. n. & in casu extremæ necessitatis referatum, *Bartholino* & *Blasio* l. c. vel planè non per urachum, sed arteriarum aliquam, quod probabile censet *Doctiss. Lindenius*, teste *Blasio* l. c. vel, ut *Varolio* & *Riolano* l. c. per venam: quod suis auctoribus relinquimus. Nec idcirco dicendum statim est cum *Laurentio*, frustraneum esse urachum, cum adhucdum nihilominus celebrem obtineat usum, dum consentientibus omnibus *Anatomicis*, ligamenti munere fungatur, quo vesica

peritonæo annectitur & sustinetur, ne quando urinâ distenta est, cervix ejus comprimatur, vel vesica onere pressa labascatur. Expeditis his, videbimus porro, an & alia vasa ad umbilici constitutionem concurrant? *Nervis carere* umbilicum tota ferè Medicorum Schola proclamat; & egregiè de nervorum absentia contra varios Anatomicos *Spigel.* (k) disputat, teste *Blasio l. c.* Rationem affert ex *Galeno Aquap.* (l) & *Vesling. l. c.* quod fetui non sit opus nervis & cerebro, quoniam non sentiat, nec moveatur, nec ullam habeat partem, quæ publicoungeretur munere, præter unicas arterias & venas, ad nutritionem & augmentationem necessariò requisitas. Verùm refutatur hæc ratio ab *Harveo* (m), & falsitatis etiam arguitur ex supra dictis, dum propria vitâ fetum vivere, & proprii cordis facultate sanguinem efficere, & distribuere diximus. Quicquid a. sit de hac ratione, sanè si *Riolano l. c.* credimus, reperitur in urachi medio nervulus candidissimus, quem ab interiori vesicæ tunica produci ipse apprehendit; & *Galenum* [n] id ipsum obscurè significasse dicit. *J. Th. Schenck.* o) suum qq. addit calculum, & testatur, accuratiori oculo confirmari; ipsum etiam funiculum satis acutè sentire. Hinc idem hîc evenire putat, quod cum renum nervis, quos antiquitus nemo eorum substantiam ingredi vidit, hodiè v. vel leviter in profectione versatus, non ignorat. *Summus quondam Medicus Gr. Horstius* [p] umbilici substantiam pari modo *nervosam* vocat. Sed cum unius aut alterius fide res non solvatur, aliorum adhuc suffragia nobis expectanda sunt. Pari ratione ἀπὲς jubemur in asserendis *venis lacteis*, quousque evidentior illarum exortus & via profurgat. Ad uterum quidem tendere tubulos lacteis similes *Deusing.* (q) asserit: an v. in ipsum etiam umbilicum, de eo ibi nihil dicit. In *Inst. Anat.* verò p. 505 pulchræ cujusdam observationis meminit, quam habuit Anno 1655, dùm per umbilicum catellorum utero contentorum cum vasis umbilicalibus *lactum ramum* ingredi, manifestè notavit: probabili sanè, ab analogiâ ad fetum humanum, conjecturâ, idem hîc evenire; licet ob succi sui depletionem citius forsan dispareant ejusmodi vasa, quam oculis ea assequi concedatur. Etiam *Lympha ductu* lacteis analogos in chorio primitus oriri, ultra chorion v. & amnion non extendi, persuadent *J. Th. Schenckio* collectiones *Wierhoni* doctissimæ, cum exiles admodum, quas tn. de monstrare ad oculum nondum potuere. Harum vicem repræsentare ajunt, maculas albas, mucagine plenas, quæ tùm in placenta, tùm in ipso

(k) l. c. p. 113

(l) l. c. p. 52

[m] l. c. p. 376

(n) In troc. duct. c. 11.

(o) l. c. p. 119.

[p] append. l. 1. obs. med. p. 91.

[q] de gen. fet. in ut. p. 153.

[r] l. c. p. 20

ipso funiculo vasorum occurrant. Certiora forsan dies docebit. Hæc itaque sunt vasa illa, quæ ad umbilicalem nostrum funiculum constituendum concurrunt, quamdiu fetus utero continetur. Quoniam v. quamprimum egressus, suo hætenus administrato munere decidunt, ne molestiam haud exiguam ex longitudine suâ resultantem homini crearent, satius visum fuit post exclusionem ea rescindere. *Resectio v.* illa v. statim post exclusionem administratur, dum secundis intus hærentibus adhuc pendulus est ex utero materno infans: vel differtur, usque dum fetus cum universo secundarum appendice fuerit exclusus. Pro posteriori modo pugnat R. à castro [s], sed ultra sex horas non differt. *Bartholinus* v. antiquum dicit, & alienis magis quam nostris moribus receptum; hinc & (t) eundem reprobat. Infans enim hæc ratione negligitur, sanguis que liberè in illius detrimentum per vasa umbilicalia egreditur, præsertim ubi sequaces non sunt secundæ. Præfert itaque alterum, quo statim resecatur chorda, & nostris obstetricibus in more est: Nam manus obstetricis trahentis id pondus spondet, quod adhærens fetus, qui sine ratione trahit. Tum etiam resecto umbilico & commodius obstetrix venatur secundas, & tutius ipse fetus procuratur, & ab externis injuriis defenditur: Quodd si v. obstetrix sit impedita, & manibus adstantium non satis fidimus, ne intro recedat umbilicus, maximo cum puerperæ malo, femori illius alligari potest. Vel denique si resectus satis sit robustus, appensis ponderibus retinetur, ex consilio *Hippocratis*, seu appendicibus ex stanno vel pumbo, quemadmodum explicat *Hollerius*. (u) Priusquam v. abscindatur, vinculo, quod ex serico vel linteo vult factum *Ioel* (vv) sæpius circumducto probè constringendus est umbilicus; & quidem intervallo ab infantis abdomine duorum vel trium transversorum digitorum: tum demum, quod supra ligaturam est, tribus circiter, juxta *Mæb.* (x), vel, juxta *Aët.* (y) quatuor digitis resecatur, instrumento ad id accommodo, quod *Polluci* ὀμφαλίστης dicitur. Acutum scalprum requirit *Aëtius* l. c. aliam enim materiam arundinum vel vitrorum reprobat, ut ne quid atteratur. Quæ cum facta sunt, curandus est umbilicus, donec exsiccatu sponte suâ decidat. Cujus decidentiae tempora, teste *Bartholino* (z) incerta sunt, pro nati constitutione & affluentis sanguinis copiâ: ut plurimum tamen quarto die labitur, ex observatione *Ioelis* & *Aëtii* l. c. Quod ut felicius succedat, quamprimum ligatus est umbilicus, monitore *Aëtio* l. c. contentus in ipso sanguis grumofus exprimatur, puta, si validus sit infans &

(s) l. 4. c. 7.

(t) cent. v. hist. 39.

(u) comm. in aph. 4.

(vv) Pr. l.

2 c. 1. p.

497.

(x) l. c. p.

566.

(y) tetr. 1.

f. 4. c. 3.

(z) A. R. p.

202.

-pletho-

plethoricus, ut limitat *Schmizius* (aa) : secus si macilentus fuerit, & inter angustias hærens difficulter exclusus, & suffocationis metu quasi exanimatus sit, tunc ante ligationem adhuc ex vasis umbilicalibus cum vehementiâ sanguis contentus in corpusculum infantis manu retrudendus est, ut cor affusâ sanguinis portione vires resumat. Expressus sanguis spongiâ detergeatur, ac lanâ carptâ obturetur : postea moderato sale per se tenuissimo conspergatur. Ad præcavendam porro hæmorrhagiam *F. Hildanus* (bb) vult obstetrices instructas esse seq. pulvere, qui, postquam abscissa fuerint vasa, illicò inspergendus est :
 ℞. Aloës, thur. sang. drac. ana ʒi. CC. usti, terræ sigill. farin. volatil. ana ʒij. Pil. lepor. minutiss. incisor. ʒß M. Post hæc duplicatus umbilicus & lanæ involutus, leniter in medio componatur, posteaque de more infans fasciis involvatur. Cum deciderit, cochleæ testam ustam tritam loco insperge, aut talum suillum ustum, aut plumbum ustum cum vino illine & obliga, ex præscripto *Aëtii l.c.* Curatus ita, formatus & consolidatus umbilicus robustâ cute inducitur, & in eam denique abit substantiam, ut in adultis videre est. Sensim enim intra abdomen cum suo funiculo vasa umbilicalia, tanquam vieta & emerita exolescunt, & in ligamenta vel tendines degenerant, partium earum quibus inseruntur, uti communi consensu testantur Auctores.

(aa) Comp
Pr. p. 129.

(bb) cent.
1 obl. 52.

C A P. IV.

Situm cum Connexione, quantitatem & figuram monstrabit.

INquirendum nunc ulterius in umbilici *accidentia*. Hæc inter primò *Situs* occurrit, qui alius est in embryo adhuc rudiore, quàm perfectiore. Dùm enim *rudius* est Embryum, umbilicus ab hoc ipso exiens, liquori amnion inter & chorion contento, innatat, ulteriusque paulatim ad membranas ambientes ac Placentam exporrigitur. Eodem v. *perfectiore* supra pectus ordinariè reflectitur, & sinistrorsum circa collum ab occipitio ad frontem producit, donec plurimis rursus ramis vasorum contentorum per membranas expansas ad ipsam placentam extenditur : quæ communis semper & ordinaria est umbilici flexura, ns. quòd observaverit hoc peculiare *Bartholinus* (cc), quòd interdum in dextrâ *cervice* incipiens collum ambiat, statimque progrediatur ad placen-

(cc) l. c. p.
199.

tam :

(dd) l. c. p.
332.

(cc) cur.
sec. p. 152.
(ff) l. c. p. 1.
c. 3. & p. 2.
c. 1.

(gg) comin
de, sang.
mot. p. 98.
(hh) Herc.
Med. p. 190.

(ii) de L. L
l. 6. p. m. 49
(kk) l. 6. de
fabr. corp.
hum.

(ll) 3. Ar-
chit. c. 1.
(mm) l. xv.
de V. P. &
l. xi. de pla-
cit. Hip-
pocr. &
Platon.

(nn) l. c. p.
198.
(oo) l. A.
p. 146.

(pp) Ca-
lendar. de
A. 1670.

tam : interdum qq. simplici hoc flexu in sinistra collum velut torque involvat. Prospexit hac umbilici revolutione embryo Natura, ut caput firmaret & contineret, ne ante perfectam maturationem suo pondere deorsum in utero decumbat, teste Riolano (dd). Quod v. per contenta vasa ipsi etiam utero annectatur, uti scribit Vesling. l. c. id, præsertim si immediatam vasorum fetus & uteri connexionem intelligat, jam supra ex observ. Harv. negavimus; negat idem Deusing. (ee) cum Arantio, Spigel. (ff) Slegel. (gg). Intra abdomen ratione vasorum suorum diversorum etiam variis partibus cohæret, ratione sc. arteriarum arteriis cruralibus ex aortâ descendentes, unde commercium cum corde habere creditur Höfero (hh) ratione venæ cum hepate, venâ cavâ & portæ; ratione urachi, si adest, cum vesicâ. Connectitur etiam in itinere suo cum peritonæo, à quo involvitur, donec ad superficiem abdominis pervenit; in ejus mediâ residet regione, uti oculis patet. Num v. totius corporis centrum occupet, de eo non omnimodè conveniunt Auctores. Negat Varro, (ii) cui potius infra umbilicum, per id quo discernitur homo, mas an femina sit, linea ducenda videtur. Ad quem locum Gothofredus notat, & A. Vesalium (kk) tradidisse, non in umbilico, sed in pubis ossium coalitu corporis humani exquisitum medium esse; contra receptam Veterum auctoritatem: Cum quâ facit Vitruvius (ll) & Galenus. (mm) Affirmant etiam ex Recentioribus Bartholinus (nn) Moeb. l. c. Deusing. (oo) Rationem insuper addit Lauremberg. l. c. quia est instar radicis, per quam fetus matri, ut arbor terræ adhæret; per quam etiam fetus alimoniam allicit. Quocirca tantum debebat abesse ab uno extremorum, quantum ab altero: Eâ tn. proportionem observatâ, ut notat Vesling. & Deusing. l. c. ut gravitas major tributa sit partibus superioribus, quod facilius sit capitis ad uteri orificium inclinatio. Facilis v. videtur hac in re Auctorum conciliatio, si dicamus, Vesalium cum asseclis medium quæsisisse in homine pedibus erectis stante, & sic verum obtinere suam sententiam: cum Hi medium in umbilico posuerint, quando homo expansis & brachiis & pedibus vel stet, vel jaceat: tunc enim circinus impositus altero crure umbilico, altero exactè totum circumit hominem, quod cuivis primum erit tentare. Dicta v. hæc de situ umbilici non sunt extendenda ad bruta; aliàs notabilis est ejus situatio in Apris Brasiliensibus, uti ex Barl. Hist. Brasil. refert Abr. Seidelius (pp) ajens: Es ist eine art wilder Schwein in Brasilien/wie die Europäischen/ werden aber nicht grösser als bey uns die

die Frischlinge / haben den Nabel auff dem Rücken / wann man auff denselben Nabel truckt / so gehet Milch darauß / wann man aber hart darauß schlägt / so sterben sie davon. *Pervenimus ad Quantitatem. De Discretâ si quæras, Naturæ lege unus est umbilicus, si unus sit fetus. Interim tn. præter naturæ ordinem in Annâ Viro quodam Italo, & pene qq. & podice privato planè deerat: circa cujus tamen locum pila quædam fungosa erat enata, per quam velut spongiam urinam stillando reddidit, uti observavit Celeb. Bartholinus (qq) Continua v. quantitas longitudine admirabilis est, judice Riolo (rr), quæ licet in fetu, dum magnitudine muscæ cernitur, recta sit & brevis, indies tn. ad partum usque magis producitur, ita ut in partu extensus umbilicus, nostratis ulnæ longitudinem æquare possit, qualem m. observavit in puellâ recens natâ & occisâ Barthol. (ss) & Pavvius obs. an. i. in fetu. Idem (tt) in alio, octo digitos longo, umbilicum ad digitos transversos 24. accedentem vidit. In fetu jam ad exitum maturo per spithamarum trium mensuram umbilici longitudinem dimetiuntur Vesling. l. c. & Blasius [uu] Barthol. v. [vv] per ulnæ unius cum dimidiâ. Sæpius duas ulnas æquare suâ longitudine, scribit Lauremb. [xx] Quin immò ulnarum aliquot communiter esse solet, ait F. Hildanus [yy] Crasitie v. comparat umbilicum minori digito; sicuti Vesling. l. c. digito absolute. Causam hujus prolixitatis hanc dat Lauremb l. c. ut eò perfectiùs coquatur sanguis. Alias addit Deusing. [zz] ne sc. motu fetûs ac contorsione abrumpatur umbilicus, vel placenta divellatur; possitque fetus tempore partûs cum minori impedimento & alternatim in lucem prodire, quod minùs commodè fieret, si brevi funiculo hepatis uterino sæpè firmiùs hærenti, esset adnexus. Accedit, quòd ad secundarum extractionem mirè conferrat hæc longitudo, ut patet ex Hippocr. l. de superfet. Quòd v. longior sit umbilicus in homine & aliis animalibus, unicum tantum fetus in utero gestantibus, quàm in animalibus quæ plures edunt, ideò fieri putat cum Aquap. [a] Blasius [b], quia quæ plures fetus concipiunt, in iis necessarium est, ut moles carnea utero non solùm, sed & unicuique fetui vicina sit, quòd sic locus sufficiens omnibus detur, & ideò vasa hæc brevissima natura construxit: in aliis contra, quæ singulari fetu gaudent, eadem moles utero adhæret, sicque à fetu ipso quàm remotissimè abest, hîc ergò opus rursus fuit, vasa longissima fieri. Crasitie v. ratio ea videtur Deusing. (c) ne comprimantur vasa, impediaturque sanguinis alteriusque succi transitus. In adulto homine exigua est umbilici quantitas, uti patet: potest tn. propter superinductam cutim p. n. in*

(qq) cent.

l. h. 65. & A

R. p. 205.

(rr) l. c. p.

330.

(ss) cent. i.

h. 14. p. 27.

(tt) obs. 6.

p. 13.

(uu) An.

contr. p.

238.

(vv) A. R.

p. 201.

(xx) l. c. p.

309.

(yy) cent.

2. obs. 50.

p. 210.

(zz) cur.

sec. p. 307.

(a) l. c. p. 55

(b) in not.

ad Vesling

c. 8.

(c) l. A. p.

147.

(d) l. c. p. 3.
(e) l. c. p.
374.

(f) l. c. p.
148.

(g) An.
contr. p.
238.

(h) l. c. p.
102.

(i) l. c. p.
119.

immensum sæpiùs dilatari. Ut ex cap. vi. patebit. *Figura* adeò notabilis est, in fetu præsertim, ut totus umbilicus inde, quod supra pag. 6. videre est, nomina acceperit. Ad mollem v. vasorum inclusorum flexum formatus, non simplex est, sed *tortuosus & inæqualis*: ita ut trunci venarum & arteriarum postquam ad trium quatuorve digitorum spatium digressi sunt ab abdomine, inter se egregiè contorqueantur; ordinatâ tñ. ut plurimùm circumvolutione, quemadmodum funiculus major è minoribus circumgyratis oritur, teste *Blasio l. c. Bartholinus l. c.* strias monocerotis nostri æmulâ similitudine referre dicit, quod opposito lumine faciliè videamus. *Aquap. (d) & Harveus (e)* cereis funis instar intortis comparant. Inæqualitatem hanc adaugent nodi illi, de quib. supr. Fit hac ratione, ne vasa invicem implicentur, nec sanguinis vel chymi per ipsa impediatur motus: nam unumquodque vas circumgyratum servat nihilominùs cursum suum. Tùm m. sensim sine suffocationis metu debitum sibi sic recipit embryo: paulatimque alimentum depuratur, *sec. Barthol l. .* Qui & illud notandum hîc nobis exhibet, spithamæ sc. à conjunctione distantia mirabilem texturam apparere, asperioresque contorsiones, & velut confusionem: In exteriori deinde tunica intestinuli infinitas secundum longitudinem incisuras conspici, de foris sanguine tinctas, quales in cerebello videre est: Tandem etiam transparere in venâ maculas, à sanguine transparente pertunicam tenuiorem. Ob quæ *livefcere* dicuntur *Deusing. (f) & colorem ex albo cæruleum habere Blasio, (g) varium Lauremb. (h)* ita ut interdum niger, aliàs pallidus, fuscus, ruber, appareat. Cùm jam rescissus est post partum umbilicus aliam formam induit, & parum prominulus & hincuscus cernitur, ut teste *J. Th. Sibenk. (i)* umboni similis sit, unde & nomen.

C A P. V.

Usum Physiologicum explicat.

Restat ut in umbilici *usus* penitiùs nos immittamus, quos ex se largiter in omnes Artis partes distribuit: *Physiologicus* cùm jam suis cuique vasi proprius ubique sit additus in præcedentibus paucis hîc erit expediendus. Præcipuus, & cujus gratia primariò à Naturâ conditus videtur umbilicus est, ut sanguinem cum reliquo succo nutritio, intra membranas contento, perpetuo circulari motu, non per venas solum ad fetûs cor advehat, & ab eodem in placentam per arterias depellat; sed & in tortuoso suo flexu, nodis & longo itinere magis commisceat.

perficiat, & adjuvante, *juxta Deusing*. (k) particularum sui ipsius motu, & calore à matre communicato idoneum reddat, ut exinde ritè & nutriantur & augeantur partes tam intra quàm extra embryum sitæ: Quicquid contra, sine sufficienti fundamento inferat *Courvaux*. (l) Rationes enim, quibus probare nititur fetum per umbilicum omninò non nutrirì, & neque per venas neque per arterias ad fetum aliquid advehi, sed potius à fetu expelli, sufficienter refelluntur ab *acutissimo Deusing*. (m) Sicut & ipsum officium, quod ipse tq. primum ac præcipuum umbilico adscribit, *spirare sc. per illum cor, funderèque humorem in conceptu contentum*. Largimur autem lubentes, non omnem nutritii succi admissionem fieri per umbilicum, sed partim etiam per juxtapositionem sive habitum corporis, *juxta Courvaux l. c. & Deusing*. (n) partim per ipsum os, in embryo nim. grandiore, *juxta Hippocr. Democrit. Epicur. Deusing*. [o] *Harveum* (p) *Back*. (q) Tamen tq. secundarium, usum refrigeratorium & aëris attractionem per arterias umbilicales tolerari posse putat J. Th. *Schenck*. [r] quod ipsi probandum relinquimus. Pro secundario usu v. admittimus, quòd per eum fetus suspendatur, quò in omnem partem se movere possit, ratione longitudinis liberiores exitum, ratione crassitie vasorum tutelam efficeret. Satis generalis & ille usus est, à *Deusing*. (s) notatus, quo pro ductu involvente sumtus vasa à fetu ad uterum maternum surgentia complectitur, singulaque distinguit. Usus v. umbilici in *adulto* ordinariè nullum esse, ait J. Th. *Schenck*. (t) ns. velis, ut suspensum fortiter gerat hepar. Tandem commune est omnibus, *judice Benivenio ap. Ioh. Schenck*. [u] ad decorem umbilicum prominere.

C A P. V I.

Affectus p. n. exponet.

PATHOLOGIAM odoriamur, & videbimus sedem præbere nostram partem tam causis morbi, quàm morbis ipsis, & eorum Symptomatibus. *Causam* morbi propinquiorem subministrant humores, præcipuè ferosi & acres, ac flatus p. n. non rarò ibidem collecti. Inter *remotiores* p. n. referendi sunt *Vermes*, quos nidos suos struxisse in umbilico cum gravissimis sæpè symptomatibus experientia satis testatur: & observant ejusmodi *Salmuth*. (v) *Forestus* (x) I. *Baptist. Caballaria*, teste *Omnibono* (y) ipse m. *Hippocr.* (z) Similia annotarunt *Nic. Florentinus* (aa) & *Hollerius* (bb) it. *Zac. Lusitan.* (cc) Inprimis tamen infestant ingrati isti hospites *Infantum* umbilicos, ut valdè hinc extenuentur & tabescant, teste *Hier. Reusnero obs. med. 97. curâ Doctissimi Augustanorum Medici Dn. D.*

(k) cur. sec
p. 293.

(l) Paradox. p. 1. c.
12, p. 55,

(m) l. c. p.
288, seqq.

(n) l. c. sect.
2.

(o) l. c. sect.
4.

(p) l. c. p.
248.

(q) l. c. p.
49. & 87.

(r) l. c. p.
123.

(s) l. A. p.
146.

(t) l. c. p. 78

(u) obs. p.
2. l. 3. p. 616

(v) cent. 2.
obs. 61.

(x) l. 7.
schol. ad
obs. 35.

(y) l. 4. c.
13, art. Med
in fant.

(z) 7. Epid.
t. 105.

(aa) serm.
5. tr. 8. c. 54.

(bb) l. 1. c.
58. de
morb. int.

(cc) l. 2.
prax. adm.

obs. 70.

G.H.Velschii edit. Addit v. plurimos feliciter curatos à D. Frid. Oleviano, applicando umbilico aut fundulum piscem, aut ranam vivam. Hac enim ratione vermem extrahi brevi temporis spatio. Per fundulum m. utrum in infantis umbilico vermis aliquis lateat, explorare jubet *Illustris Sennertus*, [dd] qui si depascatur, signum est latitantis vermiculi, & puerum occultè torquentis. Is autem vermis, ait, tam se insinuat umbilico, ut manibus extrahi non possit, necatur tamen appposito vitro veneto pulverisato in putamine dimidiæ nucis juglandis. Primo hoc hoste debellato, alterum aggredimur, qui *calculis* s. lapidibus vel tophis nostrum petit umbilicum, in quo si reperiuntur inibi generati, affectus *Poromphalos* dicitur, teste *Auctore lib. definit.* Vidit ejusmodi lapides in umbilico *Columbus* (ee), & genitos ibi lapillos reperit *Folius*, teste *Barthol.* [ff] Testantur etiam ejusmodi repertos *Dan. Becker.* (gg) & *Marc. Donatus* [hh]. Nec lapides solum, sed & *ossicula*, quod mirum est, in ventre parte molli, & omni osse destitutâ reperta & excreta per umbilicum observarunt Auctores. Quale ossiculum tenue, oblongum, ad latitudinem duorum ferè digitorum excretum vidit *P. Forestus l. c.* Observandum v. est, plerumque ejusmodi ossicula, si excluduntur, excludi per mulierum, quæ fetum mortuum utero gerunt, umbilicos: qualia fetus mortui ossicula post sponte rejecta aliquot, per mulieris umbilicum se exemisse, illamque diu superstitem vixisse, testatur *Albucasis* (ii) ap. *Ioh. Schenck.* qui similes ferè historias habet (kk). Cum omnibus v. his enumeratis morborum causis p. n. præter ingentes dolores plerumque exulcerationes umbilici sunt conjunctæ.

Ad morbos ipsos dum jam pervenimus, observamus & intemperiei morbis, & organicis & solutæ unitatis miserum umbilicum affligi. *Intemperiei* morbus notabilis est ejusdem *inflammatio*, ὀμφαλῆ φλεγμονή, quæ fervida centri abdominis intumescencia *immediatè* provenit ab impedito sanguinis affluentis transitu, moramque longiorem ibidem nectentis. Qui sanguis, si ad *mediatas remotiores* causas transire velimus eò concurrit *vel* ob læsionem ab aëre externo, uti vult *Magnificus Ions* (ll) *vel* ex dolore, tunc temporis potissimum, cum obstetrices imprudentes fuerunt in administrandâ umbilici sectione. Hippocrate teste [mm]. Indicat ergo affectus hic sanguini liberum esse reconciliandum transitum, affluxum reprimendum, fervorem restringendum, & impetum aliorum cogendum. Commodissimi huic fini sacculi ex fl. Sambuc, melilot, chamæm. & nitro parati. Si dolor adest ingens, applicari potest ex vitello ovi tam crudo quàm cocto cum nitro paratum empl.

(dd) l. 3. pr.
f. 984.

(ee) l. 15.
Anat.

(ff) A. R. p.
204.

(gg) l. 1.
med. mi-
croc. c. 15.

(hh) l. IV.
c. 30. ap.

Sennert.)
Pr. l. 3. p. 10

c. 4.
(ii) l. 2. c.

76. Chi-
rurg.

(kk) l. 4.
obs. 178. p.

410. 412.
Vid. etiam

Bartholin
de insol.

part. hum.
viis.

(ll) Id Med
Pr. l. 12. t.

p. 745.
(mm) 24.

aph. l. 3.

doloris enim vehementiam demulcet, & fervorem nimium extrahit. Dandæ qq. infantibus emulsiones (nauseant enim præter pulticulam & lac ferè omne) ex sem. 4. frig. maj. cum tantillo papav. alb. parandæ, ut sanguinis fervor temperetur, ac somnus concilietur, & quidem cum decoct. CC. aut rad. Scorzon. malv. gram. lacteus enim & ferè insipidus plantarum harum succus decoctum suave affert. Pulveres qq. de marg. ppt. lap. cancr. ppt. exhiberi possunt, ut hac ratione lactis qq. concretio in ventriculo prohibeatur, præsertim si matris constitutio minùs fuerit salubris. *Experientiss. Gr. Horst.* (nn) cum Höfero (oo) suadent, dum recens est malum, in unguendum puero exterius ol. rosar. cum ol. lumbric. permistum, donec inflammatio remittat, ubi chamæmelinum, ac tandem m. anethin. discutiendi gratiâ addatur. Mastix pulveris. & eum album. ov. Empl. formâ umbilico imposita pro ulteriori exsiccatione materiæ commodè interdum præscribitur: Nutricis interim diætâ ad frigidum & humidum inclinante. Suppuratio enim, quantum fieri potest, prohibenda est, mōnente *Excell. Ions-ton. l. c.* Periculosa namque est hæc inflammatio, si in abscessum mutetur, eoq̃ue rupto intestina procidant, uti prædicit *modo laudatus Ions-ton. l. c.* Si organicos porrò quæras in umbilico morbos, non rarò mala se offeret conformatio in venarum artiarumq̃ue umbilicalium cavitatibus. Hæ enim postquam defunctæ primario suo post partum officio, debebant esse firmiter occlusæ, arque ligamentorum instar coalitæ, p. n. sæpiùs reserantur, & hiant ob acres falsosq̃ue humores eò penetrantes: unde miranda illa excretorum symptomata, de quibus suo post loco. Nisi ergò conducatur, ex singulari Naturæ instituto, per reseratas illas vias excerni superfluos & noxios in corpore humores, acris illa falsedo lenientibus sedanda, adstringentibus deinde cavitas illa p. n. rursus constipanda. Magis tamen conspiciendum sese effert in umbilico *morbis aucta magnitudinis*; diciturq̃ue prominentia, dilatatio, excrescentia, egressio, procidentia, intumescencia, tumor, protuberantia, extuberantia umbilici; hernia umbilicalis, Gr. ὀμφαλοκήλη, ἐξ ὀμφαλος, ἐξ ὀμφαλον παθος & c. quo ἐξ ὀμφαλῶν nomine, si *Corvinol. c.* credimus, etiam ipsi hoc morbo affecti salutantur, *Her. niis* affinis est hic affectus, ait *Primeros.* (pp) eoq̃ue nomine etiam inter *ramicum* species numerari dicit *loel* (qq). Ab umbilici v. inflammatione eò discernitur *Ions-ton* (rr) quòd umbilicus tactui cedat, color cutis non mutetur, nec pulsus vel dolor, nisi intestina valdè prolapsa sint. adfit: *Celsus* (ss) putat quidem commune omnibus esse, ut indecorè promineat umbilicus; *Exempla tn. cum Primerosiol. c.* testantur, *maximè fami-*

(nn) ap-
pend. l. i. p.
2. q. 8. p. 91.
(oo) H. M.
l. vii. p. 345.

(pp) En-
chir. Med.
Pr. p. 2. 278
(qq) Pr. l.
ix. c. iv. p.
526.
(rr) l. c. l.
xii. t. 3. p.
746.
(ss) de re
Medi. vii.
c. 14.

(tt) cent. 2.
hist. 95.

(uu) cent.
1. hist. 2.

(vv) l. c. p.
526.

(xx) l. c. p.
514.

liarem esse hunc morbum *feminis utero gerentibus, & infantibus*. Quod propter varias accidere potest *causas*, inter remotiores v. in illis plerumque est partus laboriosus, ut inde Th. Bartholin (tt) Omphaloces communi parturientium malo satis innotuisse dicat: in his ploratus, malè ligatus umbilicus, tussis: in *utroque* percussio, vociferatio, risus immodicus, saltus, ponderis gravioris elevatio, equitatio, tubarum inflatio, aliusque conatus nimius abdomen distendens. Immo *supra naturale* quid interdum in causâ est, quale exemplum narrat *πολυίωρ Medicus Barthol* (uu) de tribus Pastoris cujusdam infantibus, quorum umbilici, relictis papillis, alexipharmacis & amaris illitis, à Suctore quodam nocturno, Caprimulgo aliis dicto, tam vehementi suctione atterebantur, ut non tantum manifestè prominerent, sed & oris sugentis magnitudinem, impresso velut vestigio monstrarent. Proquiores *cause* faciunt, ut & variæ inde resultent prominentiarum *differentiæ*; hinc *Primerosio* l. c. teste, quæ ab *aquâ* oritur, *Hydromphalos* dicitur; quæ à *flatibus*, *Pneumatomphalos*; quæ ab *intestinorum prolapsu*, *Enteromphalos*; quæ ab *omentis procidentia*, *Epiplomphalos*; quæ tandem à *carne increcente*, *Sarcophalos* dicitur: His addi potest, quæ à *sanguine fluido* ibidem collecto oritur, *Hæmatomphalos*. Ut in genere aliquid de *Prognosi* dicamus, levibus tumoribus, *Celsus* l. c. *judice*, facilè subvenitur; at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione, periculum est: aded ut Joël (vv) dicat, quod diuturnus umbilici prolapsus, quando sine dolore ad magnitudinem capitis infantis procrevit, frustra repelli tentetur, & sine curatione per totam vitam geretur. Communiter m. infantum hac in parte eminentiæ faciliorem admittunt medelam, quam adultorum, in primis si gravia in his subsequantur symptomata, qualia sunt colicæ & iliacæ passionēs, vomitiones, tabes &c. Ita in innumeris ferè pueris curata umbilici eminentia & crassities catapl. ex *saniculâ* in vino coctâ, umbilico impositâ cum ligatione strictiori: & rad. consolid. maj. contusâ, dorso è regione umbilici admotâ, uti testatur *Achilles Gasserus Obs. 93. ap. supr. laudatum G. H. Velschium*: ap. Eundem H. Reusnerus obs. 96. H. & rad. Sanic. in aquâ solum coctam calidè imposuit pueri cujusdam exomphalo, & mox sanatus est. Filiola v. ejus eodem umbilici exitu cum inflammatione & humiditate afflicta, seq. pulv. insperso convaluit. ℞. bol. or. ver. ʒj. myrrhæ ℥ij. pompholyg. ʒß. F. pulv. cujus pulv. usum eò feliciorem censet *Excell. Velschius*, si pulvilli & globuli umbilicales simul adhibeantur: & præstare, ait Joël (xx) intra corpus infantulo exhibere ℥j. pulv. rad. scrophular. cum lacte; Plurimum etiam conferre, si ar-

si atroglossa & muscus pruni sylvestr. simul in vino cocta & contusa
 instar cataplasmati umbilico imponatur, quem muscum etiam com-
 mendat *Ionst. l. c.* *Forestus* rotulas e corio confectas, & oxycroceo inun-
 ctas laudat. Promiscuè etiam in hac *J. Langius V. Palatinorum Electorum*
Serenissimorum Archiater efficax prædicat seq. empl. ℞. pic. græc. ℥ij.
 coloph. resin. ana ℥j. mumia ℥iij. tragacanti, gumm. arab. sang. drac.
 mastic. balaust. ana ℥ij. aloës epat. ℥iij. oliban. ℥ss. glut. pisc. ℥iij. F.
 s. a. Empl. Sed cum diversæ herniarum umbilicalium species etiam di-
 versas agnoscant causas, pro singularum qq. indicationibus diversæ re-
 quiruntur curationes: Propius ergo ut ad species accedamus, necesse
 est. *Hydromphalos* itaque fit ab aqua inter peritonæum & abdominis cu-
 tem, inque *Hydropicis* ut plurimum evenit: exemplum habet ex
Amat. Lusit. (yy) *Job. Schenck* (zz) item *Fabr. Hildanus*, (a) & *Zacut. Lusit.*
 (b) Putat quidem *Joël* [c] urachi amplitudinem, & malam colligatio-
 nem in hoc affectu etiam aliquam causæ rationem habere: verum su-
 perius allata *Δύλον* *Λων* testimonia ligamentum hoc in homine pervium
 negantia, id non videntur admittere. *Cognoscitur*, & à reliquis distin-
 guitur *sec. Celsum l. c.* in eo, si pressus humor circumfluat; vel *sec. P. Ae-*
ginetam (d) si mollis quidem tumor est, sed ad compressionem non ce-
 dit; neque minuitur, neque augefcit: superaddit hisce signis *Ionst. l. c.*
 (e) quod tumor laxus sit, & candelâ appositâ limpidus & perspicuus
 appareat. In curatione intumescentiæ hujus locum habent *Exsiccantia*
 & *Discutientia*; his non succedentibus lunata sectio, ait *Ionst. l. c.* *Joël*
 v. (f) suadet imponendum catapl. ex pulv. Spicæ Celticæ & tereb. q. f.
 cui pauxillum ol. amygd. est admixtum; quibus utiliter pulv. linei
 panni adustri admisceri potest. Aut conficiatur sacculus ex spic. celt.
 & cymin. qui in vino rubro ebulliat, & expressus tumentis umbilico
 imponatur. Potest huc commodè referri, cum etiam ab humore oria-
 tur, tumor umbilici ex sanguine, *Hamatomphalo* forsan dicendus, qua-
 lem observavit *Coiter* (g) dum in Virgine quadam 35. annorum mortuâ
 sectâ observavit extensam ac sanguine turgidam venam umbilicalem
 in quibusdam locis, ubi hæc vena contorquebatur instar varicum tu-
 berosa: Tales dari tumores testatur *Aegineta l. c.* ob venæ aut (quod ma-
 lim) arteriæ ruptionem, velut in arteriæ dilatatione. *Cognoscitur* v. si
 præter prædicta signa tumor m. lividior fuerit, teste eod. ubi v. incurabi-
 lem ducit, si ex arteriæ fuerit dilatatione: vix consentio: Pergimus ad
Pneumatomphalon seu flatulentam umbilici egressionem: *Cognoscitur* fa-
 cile, cum advertente *Celsi l. c.* spiritus pressus cedit, sed pronus redit:

(yy) cent.
 5. curat. 37.

(zz) l. 3. obs.
 147.

(a) cent. 1.
 obs. 47.

(b) l. c. l. 2.
 obs. 24.

(c) l. c. p.
 516.

(d) de re
 med. l. vi.

c. 51.
 (e) l. c. l. x.

l. 13.
 (f) l. c. p.

514.

(g) in libel.
 obs. Anat.
 & Chirurg.

resupinato qq. corpore tumorem in eadem figurâ tenet. *Aegineta l. c.* inde vult cognosci, si mollities ad tactum adest, & sonitus quidam sequitur ad pulsationem, & disparet ad compressionem. Medicinam non admittere dixit *Celsus l. c.* proptereaque cum priori repudiavit *Aegineta l. c. lonston. v l. c.* cum demum difficulter curabilem censet, quando causam in visceribus latentem & foventem habeat. Aliàs, *eodem judice*, in infantibus facilè discutientibus tollitur. Cavendum hîc in primis à flatulentis cibis, tussi, fletu. Et si hinc suam traxerit originem illa prominentia, *su. fore loële l. c.* præstat hoc Empl. imponere: ℞. Sem. cymin. lupin. & baccar. laur. a. p. æ. pulveris. cum vino rubro ad pultis formam decoquantur, F. Catapl. Vel seq. & in aquoso & flatulento tumore utile: ℞. Gum. Ammon. ℥ij. resolvantur in vino austero in pultis formam, quibus admisce pulv. tenuiss. cymin. ppt. q. s. ut empl. formam acquirat. Notissima ferè species est *Enteromphalos*, quod malum *Magno Sennerto* (h) teste, propriè *exomphalon* & *Omphalocèle*, *loëli l. c.* ramex dicitur, ubi sc. ex laxato vel rupto peritonæo intestina in umbilicum prolabuntur. Mirandus fuit *Enteromphalos* ille, quem ex D. D. *Tob. Cneulino* describit J. *Schenck.* (i) Præter signa proposita à *Celso* & *Aegineta l. c.* addunt *lonston.* (k) & *loël.* (l) ille quod ad supinum ægri decubitus cum strepitu & rugitu regrediantur; Hic, quod cum tumore etiam dolor adsit. *Lethalis* nonnunquam evadit, propter gravissima symptomata, ut vidit *Doctiss. Hobokenus* (m), Aliam historiam è *Marc. Donato* (n) necit J. *Schenck.* (o) Magna v. in curatione diligentia est adhibenda; nec temere statim aperiri debet protuberantia, facta enim apertione prodeunt & effunduntur intestina, maximo sæpè cum ægri malo, quemadmodum in multis se observasse dicit *Pareus* (p) Advertente v. *lonstano*, duo potissimum exiguntur, 1. intestinorum in suum locum repositio. 2. Peritonæi laxati adstrictio, rupti consolidatio. *Repositio* fieri potest, post manum adhibitam, Empl. adstringentibus stypticis, quibus superimponi potest sacculus, ut intestina prohibeat, ne foras vergant, it: ex pulv. adstringentibus: qui sacculus rursus fasciâ latâ firmandus est. Huc facit Empl. contra Hernias dictum, vel ex pelle arietis. Eandem hîc, quam in scroti herniis curam adhibendam censet *loël. l. c.* quam ferè Emplastris & potionibus adstringentibus & conglutinantibus absolvit, uti videre est *l. c. p. 25.* Vicinum huic est malum *epioplomphalos* s. omentalis hernia; cujus exemplum notatu dignum narrat F. *Hildanus*, [q] ubi mulier ex difficili partu *exomphalon* contraxit, qui successu temporis ad magnitudinem uteri, qui fetum maturum gestat,

(h) de inf. cur. p. 2. c. 25. p. 80.

[i] l. 4. obs. 167.

[k] l. c. p. 723.

[l] l. c. p. 526.

[m] Spicileg. Epist. p. 240.

[n] Hist. mirab. l. 4. c. 3.

[o] l. 3. obs. 359.

[p] l. 23. c. 66.

[q] cent. 3. obs. 63.

stat, excrevit: ventre nihilominus suam servante proportionem. *Omentum* v. hīc prolapsum, & sensim in tantam molem exauctum ipsi persuaferunt *signa diagnostica* huius tumoris, absq; dolore enim tactuque mollis, & undique æqualis erat, à naturali colore non discrepabat, murmur nullum persentiebatur, uti fit in herniâ intestinali: in ventrem retrocedebat nunquam, etiam si alvum exoneraret, vel in dorsum ægra decumberet, sed semper in eodem permanebat statu. Similia huic cum præcedenti vult esse signa *Celsus* l.c. ns. quod mollior hic sit tumor, ab imâ parte latus, extenuatus in verticem: si quis apprehendit, elabatur. Hinc & eandem cum præcedenti requirit *curam*: cum & similes adsint causæ: in corpore v. molliore & juvenili facilior est. *Mixtus* non rarò est *ἐπιπλόμφαλος* cum *ἐντερομφάλω*, & tunc qq. mixta adsunt indicia, qualem in Nobiliss. Matronâ vidit F. *Hildanus* (r) quem contraxit in difficili partu. Non solum autem omentum, sed & intestinum in eo contentum esse, colligebat ex murmure, quod aliquando in ipso percipiebatur, & tunc qq. dolor adfuit, nunc vehemens, nunc rursus remissior, pro flatuum copiâ. Cæterum, quia huiusmodi procidentia umbilici rarò in ventrem retrudi possunt, aut si retruduntur, difficulter tamen retinentur, maximasq; molestias ægris pariunt, dum propter pondus superiores partes secum deorsum trahunt; fasciam quandam sacculatam excogitavit *modò dictus Nobiliss. Medico-Chirurgus*, quâ extuberantia illa tam commodè sursum retrahitur, atq; sublevatur, ut nullam ferè molestiam pariat, quam (s) describam & ligno expressam videbis. Restat adhuc unica expedienda species, quam *Sarcomphalon Primeros. l.c. Carnosam Ionst. l.c.* vocat, sive caro sit propriè dicta, s. fungosa, s. deniq; carcinomati similis, perinde est. Ejusmodi umbilicum quatuor digitis ad penis longitudinem prolongatum in puero octimestri vidit *Benivenius* (t). Facile à reliquis distinguitur; nam tumor durus est, nec pressus cedit, & ad nullum decubitûs modum mutatur, uti observant *Celsus, Aegineta, Ionstonus. Fungus* v. cum extra cutim sese nudum nostris oculis objiciat, primo mox intuitu cognoscitur. Raram & admiratione dignam ejusmodi tripitem fungosam excrecentiam *Fabr. Hildanus* notavit (u). *Ligatione* curabat *Benivenius* modò dictum *Sarcomphalon*, dum carnem vinxit, singulisq; diebus arctiùs deligans, non priùs destitit, quam ea ipsa præmortua penitus excidisset. Humorù siquidem affluxus hac ratione interceptiebatur. Idem fecit *Hildanus* in fungo illo triplici, adhibitis qq. anodynis, & decocto adstringente exterius; tandemq; insperlit pro pleniore curâ pulverem. Quòd si non sufficiat hoc præsidium, removetur per *caustica*: Cum v. tenella ætas *actualia* non admittat, *potentialibus* extirpabitur. Sufficiet hunc in finem bol. Armen. cum alum. usto. Possunt & alia medicamenta, quæ vasa consolidant, adhiberi. Feliciter qq. *sectiōe* removeri poterit, quâ factâ, cauterium adhiberi vel actuale vel potentiale. *Carcinoma* v. malum incurabile est *Ionstons.* (v) In Genere autem de curatione omnium hætenus explicatarum umbilici protuberantiarum notandum, quòd tùm demum sit adhibenda incisio, suafore *Ionstons* (x), cum alia nihil juvant. Probè v. quædam consideranda, quæ proponit *Celsus*, priusquàm administratur. Post hæc quomodo ipsa peragi debeat sectiō, fusiùs prosequuntur *Aeginet. & Celsus* l.c. quos adi sis. Iam ut *Solutam* solveremus *unitatem* necessum foret, ns. mali gravitas non rarò obstaret, quòd id minùs effici queat *Ruptura* namq; *Vulnera, ulcera, & Contusiones*, quæ hac in parte occurrunt, valde *periculosa* censentur Auctoris, quibus experientia succurrit. In utero si *rumpantur* vasa umbilicalia, certa mors imminet, ob denegatam per illa succi nutritii vectionem: hinc abortum fieri notavit *C. Bauhinus* (y). Rursus quamprimum fetus ab uteri claustris prodit, & vasa adhuc hærentia rumpuntur, utrinq; & à parte matris, & à parte fetûs

(r) l.c. obs.

64.

(s) l.c. p.

m. 451.

(t) c. 6. de

abditis.

(u) cent. 5.

obs. 62.

(v) l.c. p.

724.

(x) l.c. p.

723.

(y) in Epist.

ad F. Hil-

dan. cent.

2. obs. 50. &

tab. anat.

subo- 33. l. i. fig. 2.

(z) de
morb.
mul. l. 2. c.
6. p. 374.
(aa) cent. 1
obs. 54.
(bb) cent.
5. hist. 39. p.
80.
(cc) l. 3. f. 2.
obs. 147. p.
191. & seqq
it. obs. 133.
it. obs. 148.
(dd) l. 4. p.
2. obs. 28.
p. 367.
(ee) cent. 1.
h. 73.
(ff) c. 3. h.
22.
(gg) l. 3.
obs. 338.
(hh) l. 4. c. 3
(ii) Synops.
Anthrop.
Phys. p. 2.
c. 10. q. 1.
(kk) Herc.
Med. p. 190
(ll) Anat.
p. 223. &
241.
(mm) cent
1. obs. 53.
(nn) Exerc
246. ad
Subtil.
Cardan.
(oo) l. 12.
de Subtil.
circa fin.
[pp] A. R.
p. 204.
[qq] fund.
phys. p. 566
[rr] not. ad

suboritur magnum periculum; *ibi*, ne retrocedant cum secundinis, magno cum puerperæ malo, si non brevi tempore prudenti manu reducantur: *hic* cum vitæ dispendio, nisi citò ligentur, ut sæpè visum, teste *Varandæo*, (z) vel si planè evellantur imprudenter, quod obstetrici illi, de quâ *Salmuth*, (aa) evenit. An v. in extractione secundinarum retentorum, etiam *puerpera* umbilicus rumpatur, subitamq; mortem afferat? Bartholino (bb) est imperita dubitatio. Si enim in partu vero ruptus non fuit, tenso abdomine, vanus erit hic metus: nec à manu obstetricis periculum, quia extra uteri regionem, sub peritonæo ad hepar progreditur. Si de *Prognosi* rupturarum umbilici *in adultis* quæras, Barthol. l. c. falsum esse ait, rupto umbilico mortem instare repentinam; & ad Professorum observationes, quæ id refellant, provocat. Falsitatem hujus sententiæ etiam refutant Hydropicorum historiae, qui sæpè, rupto sponte suâ umbilico, in integrum fuerunt restituti, uti plura narrat exempla I. *Schenck*, [cc] ex variis Auctoribus. Historiam similem describit Gr. Horst. (dd) de muliere rusticâ. Quin etiam nec ruptum, ob intestina inclusa, umbilicum semper & ex necessitate subsequitur mors, ut *Th. Bartholin*. [ee] in muliere notavit. Licet sæpius accadat, præsertim ob graviora supervenientia symptomata, ejusmodi affectu affectos expirare, Sicut modò citatus *Barthol*. [ff] de sex mensium puerulo narrat: I. *Schenck*. v. [gg] ex *M. Donato*. [hh] accuratiorē facit mentionē illorū symptomatum, quibus urgentibus mortem oppetiit Illustris quædam Mulier. Quæ de rupturâ umbilici diximus, ferè quadrant etiam ad ejusdem *Vulnera. Læta* hæc censent multi, quos inter est *Sperlingius* [ii] & *Hæferus* [kk]. Rationem reddunt hanc: quia cum post editum in lucem fetum vena umbilicalis in ligamentum degenerat, ex quo suspenditur hepar; resecto hoc hepar collabitur, à quo trahitur diaphragma, respirationis organon: respiratione ergò impeditâ, cor suffocatur; unde mors, *juxta Laurent*. [ll] *G. E. Hildanus* v. [mm] potius vult, hepar sursum retrahi, & diaphragma adeò comprimî, ut homo neq; inspirare neq; expirare possit, immò suffocetur illicò. Hinc dicunt, Ægyptiis in more positum esse, ut grassatores & rebelles, supplicii loco vivos exuant corio: Carnificem v. prohibeant umbilicum ferro attingere si diu velint magno eos cruciatu vivere: cum v. mori illos volunt, etiam cutem circa umbilicum detrahunt, ut vasis & visceribus collabentibus homo suffocetur: uti legimus ap. *Scalig*. [nn] & *Cardan*. [oo] Confirmat hæc *Hildanus* l. c. observatione quadam in Adolescente habitâ, qui ex vulnere exiguo inter umbilicum & costas mendosâ acie gladii inflicto, mox humi procumbens, quamprimum expiravit. Seq. die, cadavere dissecto, causam pervestigans invenit interiora omnia illæsa, præter umbilicalem venam in adultis ligamentum potius, planè abscissam. *Bartholin* v. teste [pp] contraria exempla vidit *Riolanus Experientissimus*, & quivis ex Omphalocle judicare potest. Si mors sequatur, ait, ex accidenti evenit, læsis qq. interioribus, & patulo ad rerum noxiarum penetrationem ostio. Nec subitam mortem inferri ab illâ spirandi difficultate, quam prætendit *Sperling*. cum affectis: Præterea & alio ligamento valido suspendi hepar à peritonæo. Nos, si nostram superadde e licet *ἐμπύριον*, cum CL. *Maebio* [qq] & *Blasio* [rr] judicamus, si ab horum ligamentorum læsione homo non statim pereat, eum incommodius tamen & deteriorius vivere. In umbilico insuper non rarò oriuntur *ulcera, apostemata & abscessus*. Causam illis nonnunquam præbent Intestina putrefacta, uti exemplo quodam testatur I. *Schenck*, [ss] & docent fæces, quæ aliàs per alvum debebant, hinc rejectæ, quale quid observavit *Ioh. Bilger ap. Gr. Horst*. [tt] *Remotior* adhuc *causa* sunt vermes, qui intestina erodunt, uti factum notavit *Salmuth* [uu] *Pareus* [vv] 30. *Ioh. Schenck*.

[rr] not. ad Vesling p. 118. [ss] l. 3. obs. 363. [tt] l. 4. p. 2. obs. 19. [uu] cent. 2. obs. 61. [vv] l. 19. c. 3.

Schenck. [xx] & *P. Forest.* ap. *Eund.* Immo oslicula fetûs mortui per uterum excreta & circa umbilicum incarcerata aliquando in causâ apostemaris fuisse testatur *Albucaſis* [yy]. Ulceris v. illius, quod modò diximus, *curacionem Bilgerus* in se suscipere noluit, ob debilitatem infantis. Faciliùs curantur ejusmodi exulcerationes, si nulla adſit inteſtinorum corruptio. Ita Apoſtema magnum circa umbilici regionem apertum, curatum fuit à Chirurgo, *teſte P. Bayro* [zz]. Alium monſtroſum umbilici abſceſſum curavit *Gr. Horſt.* (a) dum præter diætã ordinavit lenitivum ſeq. ℞. decoct. fl. & fr. cum Sena & Agar, aucti ℥iij. Elect. Diacathol. 3vj. Sir. roſ. ſolut. ℥iſſ. M.F. hauſtus. Huic ſubjunxit apozema ex ſero caprino cum rad. Eryngii, Petroſel. ſenic. filip. pauxill. Symphyti, herb. alchimill. heder. terr. fumar. pyrol. ſanic. ſem. melon. &c. ſimul tonſore, qui ulcerati loci curam gereret, adhibito. Antiquum m. umbilici ulcus pueri Illuſtriſſimi curavit Ach. Gaſſerus (b) hoc potu vulnerario: ℞. Sanic. pyrol. a. mſſ. Conſolid. Saracen. millefol. veronic. ana mj. liquirit. ℥ſſ. Coq. in aq. ℔iv. ad conſumptionem 3. part. Colat. doſis eſt ℥ij, manè tepidè, & totidem per horam ante coenam frigidè. Quòd ſi fortè poſt vermem umbilicalem extractum ulcus aliquod relictum fuerit, ſanabat id pulv. aloës exſiccata adſperſo D. *Fr. Olevianus*, ex teſtimonio H. Reusneri (c). Huc & *Conuſio*, quæ omnino periculofa, immò quandoq; letifera: *Zacutus Luſit.* (d) utriusq; exempla habet. Ad portum tandem immenſi affectuum umbilici pelagi appelleremus, ſi unicæ *Symptomatum* ejusdem procellas ſuperaffemus: Age itaq; remis inſurgamus! Sed ecce, primùm nobis ſcopulus, qui noſtram *ledit actionem*, occurrit; Dolor ſc. umbilici, quem ſæviſſimum obſervavit in quadam feminâ *Zacutus* (e), aliisq; irritis percuravit in moriturâ opii incorrecti gr. xii. in juſculo exhibitione. Doloris quædam ſpecies eſt *pruritus*, hic dum ab acribus & ſaliſ humoribus, partes umbilici membranoſas lancinantibus oritur, ſenſationem tactûs depravat. Hunc prætereuntes etiam ad *qualitatis mutatæ* ſymptoma offendimus, *lividitatem* np. quæ ortum ſuum trahit ex humoribus vicioſis intûs latentibus, & fermentatione ſuâ umbilicum elevantibus, ut lividus ita & transparens appareat. Præcæteris v. omnibus ſeſe exſerunt, qui p. n. umbilici ejusq; vaſorum reſerationem ſequuntur, *excretorum* fluſtus. Vidit *Tulpius* ex thorace à naturâ hinc excretum *pui*, *teſte Bartholino*. (f) Quid, quòd & *Spiritus ſ. flatus* nonnunquam per umbilicum erumpere notaverit *Benavenius* (g). Nec ſolùm flatus, ſed & *faces* ipſas inde rejeſtas docent quàm multæ obſervationes *Gr. Horſtii* (h) de infante: *Salmuth.* (i) de Studioſo 20. annorum ex Palatinatu oriundo: *Cardan.* (k) de puero 8. annorum, mirabiliter per aquam fontanam & verba curato: *Alex. Benedict.* (l) de alio puero, qui itidem reconvaluit: de Viro quadraginta ſex annos nato *G. H. Velfch. obſ. 45.* de muliere tandem *Pareus* (m). Plerùmq; eroſa & exulcerata inteſtina ſequitur hæc fœcum moleſta excretio; ſpontè ergò hæc deſiſtet, ſi illis ut cauſæ ſuccurratur, quod factum bono cum ſucceſſu decocto eupatorii cannabini, quod Ibn-Tſinæ adſcribitur, cum vino parato, & poto & ulceribus infuſo, *teſte Excell. G. H. Velfchio* (n). Aliam haud inferioriorem curam in tali caſu adminiſtravit *Marc. Anton. Montagnana*, *teſte Rumlero* (o). Immo & *urinam* per umbilicum redditam à Virgine imperforatâ ſcribit *Borellus* (p). Ab aliâ Virgine nobili 20. circiter annorum idem factum, ob collum veſicæ membranâ craſſâ & durâ obductum; quæ tn. incisâ iſtâ membranâ, & filo ligato, pleniffimè reſtituta fuit à *Cabrollo obſ. 20.* quod de eo teſtatur *Laurent.* (q) Simile vidit in quodam 30. annum agente *Fernel.* (r) quod malè vincto umbilico, qui nunquam coaluerit, adſcribit. Sæpiùs præterea accidit, ut & *Hydropicorum aqua*

(xx) l. 3. obſ. 205.
(yy) l. 2. chirurg. c. 76.
(zz) l. 20. Pract. c. 4.
(a) l. c. obſ. 28.

(b) obſ. 23. ap. Velfch. l. c.
(c) obſ. 97. ap. Velfch.
(d) de Pr. Med. admir. l. 2. obſ. 37.
(e) l. c. obſ. 36.

(f) l. c. p. 202.
(g) l. 6. de abditis.
(h) l. 4. p. 2. obſ. 19.
(i) l. 1. obſ. 68.
(k) l. 18. de ſubtil.
(l) Pr. l. 20. c. 34.
(m) l. 12. c. 13.
(n) obſ. 46.
(o) obſ. 39. ap. Velfch. l. c.
(p) cent. 1. obſ. 78.
(q) l. 2. q. 28. Anat.
(r) l. 6. Pa- thol. c. 13.

(f) l. 3. f. 2.
obf. 135.

(s) cent. 1.
obf. 47. c. 2.

o. 58. & c. 4.
obf. 42.

(t) M. P. l. 5
p. 1. c. 4. p.

22.
(u) H. A. l.

7. c. 12.
(v) ratio-

nal. vuln.
letal. jud.

c. 5.
[x] l. 6. An-

trop. p. 610
[y] cent. 3.

obf. 37. &
152.

[z] Manud.
p. 87.

[aa] Chi-

rurg. c. 23.
de extr. fet.

mort. p. m.
30.

[bb] cent. 2.
o. 50. & 51.

(cc) Med.
Microc. l.

1. c. 8. p. 27.
(dd) ap. F.

Hild. l. c.
p. 210.

(ee) S. A. p.
332.

(ff) Anat. l.
4. c. 5.

(gg) l. c. p.
333.

(hh) Anat.
p. 263.

(ii) de part.
gen. p. 32.

hinc sponte fuerint evacuata, jam cum, jam absq; levamine & emolumento agri, prout sc. vel pedetentim, vel confertim fuerint emissæ; vires etiam agroti vel integræ adhuc, vel valdè debiles exstiterint: uti prostant observationes ap. I. Schenck, (f) ex diversis Auctoribus: & Fabr. Hildan. (s) Vidit & Magnus Sennertæ (t) Virum, qui plures quàm 600. lb. pendebat, in publicū tn. prodibat, in quo v. natura per umbilicum quandam serosi humoris evacuationem tentare incipiebat. Tandem & per jam exoletam, p. n. tn. iterum reclusum, vel in principio non satis probe ligatum umbilicum sanguinem promanasse, & vitæ insidias structas, non infrequentes nobis persuadent hitoria Medicæ ap. Hucher. (u) Gorf. Welsch. (v) Et ex Amm. Marcell. historia Helenæ (hæc est soror Constantini, conjux Iuliani Cæs.); obstetricem corumpentis, quæ mox natum præfecto plusquàm convenerat, umbilico, necavit, ap. Riolan. (x), ap. Fabr. Hildan. (y) I. D. Horstium. (z) Menses hac aliquando transivisse alii observarunt, testante CL. Meib. l. c. Et hæc etiam de Symptomatibus, Pergamus ad

C A P. V I I.

Quod, an & in Semioticâ usum aliquem exserat umbilicus, indigitabit.

Cùm pro innatâ sibi erga liberos suos σοφῶν, nil non tentent probi Parentes, quò de felici eorum salute certiores, si non sint, fieri tamen queant; egregiè in piâ hac causâ vel proprius matrem umbilicus adjuvat, cùm adhuc dum sub utero occultatum conjugalioris amoris pignus circumgestat. Nam, quod Paul. Barbette (aa) docet, panis in vino malvatico maceretur, umbilico matris imponatur, si fetus non moveatur, mali erit ominis. Ita in abortûs diagnosi funiculus inspectus nos faciliè ducit; dùm vel brevis nimis apparet, unde colligimus, crescentem in utero fetum pedetentim, propter hanc vasorum brevitatem, placentam ab utero matris abstraxisse; unde paulatim imminuto alimento, & viribus deficientibus, necessariò interiit, uti ratiocinatur F. Hildan. [bb]. Vel nimis longus protrahitur, ita ut in eâ laxitate sese quandoq; invertat, & contorqueat fetum, nodusq; in medio contrahatur, qui atrophia & mortis causa esse solet propter com meatum alimenti interceptum, notante Beckero [cc]. Vel etiam infantis collum circumvolvens miserum strangulet, id quod fieri observavit C. Bauhinus [dd]: Vel aliam vanam prædictionis occasionem præbeat stolidis mulierculis, teste Riolo (ee) & Varolio (ff). Vix namque conspiciam aliquid est in chordâ umbilicali, quod non characterem quandam peculiaris futuri fetûs statûs præ se ferat Obstetricibus, & quibus id persuadent credulis mulierculis, immò doctis quandoque Viris. Nota est in vulgus etiam Prognosis illa hausta ex umbilico de partibus hominis generationi inservientibus, cui & ipse Riolanus consentire videtur, hinc (gg) seriò præcipit, ut solerter & industriè reseccetur umbilicus, nodoq; religetur, cùm penis & uterus umbilici proportionem sequantur. Quod de utero dicit Riolanus, illud de pene Laurent. (hh) putans, fieri hoc propter urachi protensionem, qui ad penem, mediante vesicæ extremitate designat. Quâ opinione detentos etiam Galenum & Plazconum, ait I. Th. Schenck, (ii) Salmuth, v. dubitat (kk). Sed meritò pernegat Illustris Rolsincius (ll). Experientiæ qq. respondere negat I. Th. Schenck, l. c. Et quid de illis, quæ so, dicamus, in quibus vel nullus reperitur urachus: vel umbilico nunquam annexus? quorum multos dari, observationes Auctorum fide dignorum superius allatæ, evincunt. Ejusdem frugis est falsa illa ex nodis frugis funiculi primi de liberis in posterum edendis hariole: quam Eucharinus Rhodius ex Ibn. Tsinâ describit ap. Ioh. Riolan. (mm) si sc. in parte, quâ corpori proximus est, rugas seu nodos non habet, deinceps sterilitatem portendit.

(kk) cent. 1. obf. 68. (ll) de part. gen. inserv. p. 93. (mm) l. c. p. 332.

rendit : Sin ostendat, tot partus ac liberos promittit, quot numero nodi vel rugæ in eo deprehenduntur. Nec defuerunt huic fabulæ sui basiatores, etiam inter Doctos. Ex Arabibus, si *Casp. à Rejes* (nn) credimus, illud scripsit *Albunafar*, (oo) & confirmare videtur *Ibn t sina* (vulgò *Avicenna*) (pp). In cuius loci *comment. lac. de Partibus* (saltem illud concedit, quòd illæ rugæ seu nodi *de presenti gemellum* demonstrent, an in utero, vel non, remaneat? Cui consentit *Ioh. Alonso de Fontecha* (qq). Et hac arte, sunt, qui dixerint obstetrices in nativitate *Esa* cognovisse, quòd post eum nasciturus esset *Jacob*, atque ob id alligasse filo coccineo, ut ab eo discerneretur, ut notat *Torreblanc. Villalp.* (rr) Certam huiusmodi Omphalomanthiam confirmant præter *Salicetum Gabriel Zirbus*, (ss) *Conciliator* (tt), *Rhodigin.* [uu] *P. de Bayro* [vv]. Immo *Hier. Montanus* (xx) tq. certum signum in prole Reginae Matris Christianissimæ comprobatum fuisse ait. Verum omnia hæc futilia esse & fabulosa peritiores Medici fatentur: tenet inprimis *Rod. à Castro* [yy] *Lang.* [zz] *Barthol.* [a] *Harv.* [b] *Deusing.* [c] &c. Cùm nullâ ratione fulciantur, nec experientiâ probentur, sed alius ex alio transcribendo ridiculum hoc mendacium (ut *Rejes l.c.* vocat, & fusiùs refutat) in vulgus sparserunt. Immo *Columbus* & cum eo *Bartholm. l.c.* dicunt, non minorem nodorum numerum in ultimi, quàm in primi fetus esse funiculo: frustra ergò sunt omnium Obstetricum hæc de re fabulæ. Pari modo, quòd ex certâ nodorum distantia futuri qq. conceptus brevi vel longo intervallo divinari possint, & gemellos, si alter incumbat vel adstet alteri; falsum sæpè invenit *Bartholm. l.c.* Et aniliter hariolari dicit *Harvæus l.c.* eos, qui ex colorum varietate de *seu discriminè* vaticinari volunt, ita ut nodus si primus sequatur albus, femellam: si ruber, marem secuturum infantem præfagiat. Quam coloris diversitatem oriri autumat *Barthol. l.c.* à caloris vel defectu vel abundantia. Nonnulli v. rubentes sanguinis, pallentes lactis vel succi nutritivi albescentis, forsân nondum satis cum sanguine permixti præsentiam denotare volunt. Non minùs nodum in scirpo quaerunt, qui in *nodorum figurâ* signum quoddam venantur *sexus* subsecuturi, quod *P. Bayrum l.c.* fecisse testatur *Rejes l.c.* dum rotundos mares significare, oblongos feminas, voluit: quemadmodum de gallinaceis ovis alii scribserunt. Verum ἀλόγως: hinc I. A. *Fontecha l.c.* recurrit, quod Philosophi non esse videtur, ad ultimam illam causam, quæ & prima est, summum sc. rerum Conditorum, cui relinquendam putat effectus huius causam: nullâ tamen, ut opinor, necessitate adactus, cum ejus rei causam conetur indagare, quæ nullam unquam causam agnovit. Ejusdem farinae est prognosis ex *decidenti tempore de ætate* infantis, si nim. quintâ, à ligationis horâ, die decidat umbilicus, longævos, si tertio, brevioris vitæ futuros. Majoris fortè momenti est prædictio ex *sanguinis* post resectionem umbilici *fluxu de Variolis*. Vult enim *Schmizius*, (d) rescisso umbilico, si infans sit plethoricus, sanguinem non esse intro premendum, ex eâ ratione, quòd si effluat sanguis, ex observatione *Riolani*, paucioribus postmodum variolis laboret infans. Sed salva sit ap. me Magni aliàs Viri auctoritas, videtur in experientiâ constare non sine mortis periculo hunc sanguinis fluxum conjunctum esse, cùm nostris in regionibus, vel paucarum sanguinis guttularum fusionem ægerrimè ferant homines. Vnicum superaddamus, quod ex *situ* umbilici prædicat *Riolanus*, & ex eo *Moeb. l.c.* Si pars corporis infra umbilicum est longior superiore, ilias morborum nascitur in ventre inferiore: quia umbilicalis vena brevior, non sufficienter revellit jecur, quod pondere suo ventriculum & partes subditas comprimit. An verum, valdè dubito.

(nn) camp.
Elyf. j. q.
Lil. p. 661.
(oo) in
princip.
introduc.
(pp) fen, 21
l. 3. tr. l. c. 17
(qq) privi-
leg 8. præ-
gnant. f. m.
150.
(rr) in e-
pit. delict.
l. 1. c. 24.
(ss) lib. de
infant. a-
nat.
(tt) 10.
probl. 42.
(uu) l. 4. A.
L. c. 5.
(vv) in suo
vade me-
cum. l. 13. c.
8.
(xx) ana-
scæv. l. ult.
c. 35.
(yy) l. 1. de
nat. mul.
c. 10.
(zz) Ep. 10.
t. 2.
(a) A. R. p.
200.
(b) de gen.
an. p. 375.
(c) l. A. p.
148.
(d) l. c. p. 129.

Usum in Chirurgiâ docer.

IN Chirurgiâ facit funiculus *ad secundinarum extractionem*, si vel non rescissus sit à fetu, vel rescissus adhuc promineat; ita enim hujus ductum, tq. Ariadnæum filum, sequentur facilè Obstetricis vel Chirurgi manus: sinistra quidem apprehensum leniter trahet; dèxtra v. inuncta funiculum sequens, ubi ad fundum uteri pervenit, statim digitis inter placentam & uteri tunicam interpositis, sic eam parumper circumcisis & retusis unguibus, & summis digitis, ab utero totam separabit, ad eum modum, quo lanii pellem animalibus detrahunt; quod feliciter cessit *Aquapend in oper. Chirurg.* Sedulo autem cavendum, ut ex Auctoribus suggerit *Barthol.* (e) ne in directum trahatur umbilicus, ne uterus simul extrahatur, sed oblique hac illac vertenda secunda, sensimq; validius attrahenda. Blandâ qq. manu, non vi aut subito agendum, ob metum inflammationis, monente *Coo Sene* (f) & *Trincavell.* (g) Aliam commemorat Chirurgicam operationem *Alpinus*, teste *Barthol.* (h) quam dicit *Ægyptiis* esse solennem, qui si *dysenteriam* sanare velint, digitum intrudant in umbilicum, eumq; pluries circumducant. Præterea sat idoneum locum præbet umbilicus *cucurbitularum impositioni*, quam summè proficuum experiuntur Medici Practici in *Colicâ à flatibus* orta: adeò ut *Crato* (i) incantamenti instar Colicam à flatibus curari dicat, si ex *Galen*i præcepto, cucurbitam magnam cum magnâ flammâ ventri ad umbilicum admoveamus, etiam suadente *Frambe.* (k) & ex *Höfer* l.c. quo animadvertente, notanter dicitur, ad umbilicum, non *supra*, ne fortè syncope oriatur propter commercium vasorum umbilicalium cum corde. Exemplo hoc docet *Benivenius* (l). Nobilior est *perforatio vel Paracentesis umbilici*, quam omnino administrandam, & eò feliciùs atq; utiliùs cessuram censemus, quò sæpiùs & ipsa Natura à nemine edocta, in ægri commodum hac viâ usa est, uti plurima testantur exempla, hinc inde ab Auctoribus consignata, quorum aliquot in suas collegit observationes *Ioh. Schenck.* (m) ex *Amato, Ronseio, Valleriôlâ, Ioh. Hesso, Marc. Donato.* Eadem docet *F. Hildanus* (n) *Moebius* itidem vidit *Hydropicum*, cui ex hisce vasis spontè apertis copiosa aqua evacuabatur: idemque testatur (o) observasse *Riolanum*. Quò itaq; Natura maximè vergit, juxta Hippocratem, eò ducere convenit: Præsertim cum citra multarum partium solutionem fiat hæc umbilici compunctio: coeunt enim in umbilico vasa umbilicalia, quæ si dehiscant aquarum eò confluentium vi & impetu, sola cutis secanda erit, teste *Laurent.* (p) Nec per timescendæ sunt, eodem benè docente, convulsiones, ob musculorum aponeuroses ibi terminantes, cum eorum extrema circa umbilicum perforata sint, ut vasis umbilicalibus aditus pateat. Præferenda itaque in hydrope hæc per umbilicum compunctio ei, quæ fit sub umbilico in latere abdominis, sed tum demùm, cum in tumorem elevatur umbilicus, id quod approbant Chirurgorum peritissimi. *A. Laurent. F. Hildan. l.c. Ioh. Iessenius* (q) *I. Van Horne* (r) Ipsam autem operationem docent *Laurent. & Iessen. l.c.* Præter Paracentesin v. indigitatam dari adhuc alium modum educendi per umbilicum *hydropicorum* aquam, persuadet *C. Hofmann.* (s) *Instrumenti* sc. cujusdam *hydrulci* mentionem ibi facit, quod ab Amico quodam se accepisse dicit, & inventum esse tradit *Sanctorii Sanctorii*, cujus beneficio sine paracentesi feliciter aquam eduxerit: quoniam v. nec descriptionem, nec delineationem, ejus addit, & nos plura addere prohibemur.

(e) *cent. 5.*
b. 39. p. 79.
(f) l. de su-
perfet.
(g) l. 6. c. 28
(h) A. R.
p. 202.
(i) l. 5. f. 138
[k] in conf
f. 356.

[l] c. 39. de
abditis.

[m] l. 3. o.
147. sect. 2

[n] cent. 1.
obs. 47. II.
58. IV. 42.

[o] l. c. p.
328.

[p] oper.
Anat. l. 1.
q. 16.

[q] Inst.
Chir. p. 76.

[r] Microt.
p. 68. &
140.

(s) in Epist.
ad Hildan.
c. 5. obs. 1.
p. 208.

Usum Pharmaceuticum enarrabit.

Ite, ut in aliis partibus affectis, proficua valdè sunt medicamenta topica. Hinc in ipso partu statim, si inter angustias hærens infans difficulter exclusus, & suffocationis metu quasi exanimatus sit, suadent Medicorum nonnulli *cordialia umbilico applicanda*, e. g. vinum malvaticum; hac enim ratione spiritalitas redintegratur. De reliquis topicis adhibendis supr. cap. I I I. & cap. VI. egimus. Porro insensibili modo patet umbilicus impositis purgantibus, hystericos affectus sedantibus, vermes enecantibus &c. ait *Barthol.* (s) consentit *Moeb. l.c.* Vnde factum, ut ubi neq; per os, neq; per anum alia possunt assumi, regioni umbilicali illinantur. quæ medicamenta *umbilicalia* inde dicuntur, vel græcâ voce *epomphalia*. Ita *Ioh. Iessenius l.c.* per umbilicum saluum *catharticum* exhibuit Melancholicæ, in quartum usq; mensem alvi constipatæ: Capiebat np. fell. taur. butyr. insuls. ana ℥ iij. Extr. hel. leb. nigr. Colocynth. ana ℥ j. diagrid. gr. iv. Croc. gr. iij. mista lentoq; igne ad mellis consistentiam deducta, nucis juglandis semitesta excepta umbilico alligabat, qui intra pauculas horas ita eam exhauriebat, ut aliquoties replenda ipsi fuerit. Consentit *Aetius* (r) & iis, qui neq; V.S. neq; purgationem sustinere possunt, pharmaca umbilicalia imponenda esse suadet: & *Aegineta* (u) duas præscribit formulas. Commendat eadem in alvi adstrictione *Ionston* (v), & vult ex aloë, fell. taur. myrrh. butyr. ol. diacolocynth. Querc. & aliis paranda. *Experimentissimus Dn. D. Michaëlis* (x) habet seq. linimentum: ℞. Vng. de artanità ℥ iij. fell. taur. inspissati ℥ j. Eodem teste *CL. Moebius* aliis itritis ad Empl. de artanità, tq. ad sacram anchoram consuevit confugere, applicandum umbilico. Quidam commendant Zibethum umbilico inungendum, promoveat enim motum peristalticum intestinorum. Empl. ex felle taur. & colocynth. umbilico inpositum expertus est *Ioh. Schenck*. Umbilicale purgans hoc commendat *Iul. Cas. Claudinus* (y) ℞. ung. de artanità ℥ iij. elater. scammon. ana ℥ iij. nitr. ℥ iij. helleb. alb. sub. pulveris. ℥ i. cum fell. taur. excipiantur in formam linimenti, atque circumcirca umbilicum illinantur. Potest & tale linimentum præscribi. ℞. ol. amygd. dulc. pingued. anser. recent. butyr. majal. ana ℥ iij. Sal. Gemm. ℥ iij. specc. hier. simpl. ℥ j. Colocynth. gr. xv. diacryd. gr. iv. M. *Actuarius* qq. (z) epithema, quod lienem expurget, umbilico imponendum præscribit. Vice versâ etiam fluxum ventris antidotis umbilico applicatis sæpè consistere suo consilio, se vidisse testatur *Dott. G. H. Velsch*. (aa) Vnde nec mirum arbitratur, *Gasserum l.c.* vomitum inhibuisse, cum etiam à bile ex intestinis regurgitante sæpius accideret. Vomitus a ille, de quo *Gasserus*, visus omnibus desperatus, applicito Cataplasmate ex melle, vitello ovi & N.M. [non ventriculo, sed umbilico] eo ipso q. momento substitit. Præterea insignem umbilicis confert operam ad repellenda ventris tormina, quæ sive frigidi humores ingluvie acervati, sive acres & maligni, bilis aut splenis vitio excitent, gulosis & scelotyrbicis familiaria, frustra clysteribus atque purgantibus ore adsumtis à Medicis pugnari solet, auctis plerumque doloribus, humoribusque propterea vehementius commotis, judice *Excell. G. H. Velschio* (bb): Felicissimè v. antidotis id perfici testatur, è quibus Ipse Mithridaticam aceto solutam & pani rosto adpersam, calidissimam umbilico applicare solet; quâ solâ tq. incantamento innumeros ocyùs liberavit, purgatione, si quâ opus videbatur, postea commodius institutâ. In *Colicis Doloribus* sacculos etiam ex herbis ap-

(s) A. R. p. 204.

(t) tetr. 3. serm. 4. c. 27.

(u) de re med. l. 7. c. 9.

(v) l. c. l. 12. c. 3.

(x) Colleg. Pr. M. S. ad Ionston.

(y) de ingr. ad infirm. l. 2. c. 10. p. 217.

(z) de M. M. l. v. c. 10.

(aa) not. ad Gasser. obs. 67.

(bb) obs. Med. 41.

- (cc) Pro- propriatis applicandos suadet *I. Lud. Hannemann.* (cc) qui & (dd) oleum carminan-
drom. Le- tivum describit, quo in hoc affectu inungi vult umbilicum. Sequentem v. fotum in
xic. Med. vehementissimo Colico expertus est: & decoct. fl. Chamomill. ℥j, una cum fl.
p. 659. inf. in vesic. bubul. hæc quàm calidissimè applicita, in momento dolorem sedabat.
(dd) l. c. p. Quænam umbilico, cum vermes latentes complectitur, adhibenda sint, superius cap.
395. VI. edocti sumus: non cessat tn. ejusdem usus etiam in intestinorum Vermibus, ex
infantibus in primis eliminandis. Curatio ea consistit in eorum interemtione & ex-
pulsione, utrumq; egregiè præstat fel bubalum, cui nonnihil pulv. cym. colocynth.
& aloës est admixtum, quod stupâ s. lanâ in modum sphærulæ formatâ exceptum
(ee) l. c. p. umbilico infantis applicetur, ita jubente *Experientissimo Medico Ioële (cc).* Peculia-
514. riter qq. patrocinator sequiori sexui, ubi ad menses proritandos epithema ei admo-
vendum proponit *Actuar. l. c.* Porro tq. rarum & vulgo incognitum remedium ex
M. S. quodam depromptum, quod & partum & secundinas promoveat, suadet Ioh.
(ff) l. 4. *Schenck.* (ff) Oleum succini umbilico inungendum. *Alex. Pedemont. ap. Eund. l. c.*
obs. 171. ut mulier pariat, & sine dolore quidem, seq. præscribit. & Gallitrich. q. s. contun-
datur benè & exprimatur succus, de quo accipito poculum dimidium, & cum vino
mulieri parturienti ad bibendum dato: mox herbam expressam calidam supra
umbilicum ligato. Deniq; umbilico in affectu. Veteribus *suffocatio uterina, passio*
hysterica, uteri ascensus & c. Recentioribus, quod & Viris quandoq; infesta sit, *suf-*
(gg) l. c. p. *focatio hypochondriaca*, dicto, *Montagnana*, & ex hoc *I. L. Hannemann.* (gg) seq.
695. l. Empl. tq. secretum applicant: & Gall. Muscat. alip. musch. ana ʒi. Styrac. calamit.
Ladan. puriss. mastich. ana ʒj. xylal. xylobals. carpobals. Galang. cyper. ana ʒiij.
ros. rubr. ʒi ss. cer. nov. ℥ss. pulv. pulveris. & c. s. q. Tereb. F. Empl. umbilico inun-
gendum. Et hoc inungatur regio umbilici: & liquor N. M. ʒj. bals. succin. gtt.
xii. ol. anth. rut. ana gtt. vi. macis gtt. iv. Zibeth. gr. iiii. M.

C A P. X.

Usum in Diætâ paucis tradit.

IN Hygiene qq. habere usum, Medicorum de Emplastris nutritiis opinio innuit.
Quem nutritionis modum, si *Zacuto* credimus, primus omnium adinvenit *Hip-*
pocr. (hh) ubi extrinsecus positum alimentum ab extimâ superficie ad intima per-
venire posse asseverat, cuius mentem doctissimè explicat *Valles. in Comm.* Et hanc de
nutritione per umbilicum sententiam communem dicit *Zacutus*, omnibusq; con-
firmatam. Cùm negandum non sit, aliquem succum tam tenuem & multi habitûs
esse posse, ut ventriculi concoctione non prægressâ, verè partes carnosas nutrire
possit, & maximè si sit facilis coctionis, & promptè penetret. Cujus generis æstimat
offam rosaceam, vino odorifero, nardino unguento, aut spicato irroratam; Suc-
cum carniū per destillationem aut expressionem exactum: Gallinæ aut alterius
animalis suavissimi carnem modicè assam, & pulv. variis confortantibus adpersam:
Vitella ovorum recentissima, unâ cum sanguine columbino recenter extracto, & a-
quâ naphæ aut meliss. extr. & c. quæ ut *ευνεπτα* & odorifera, & propter odorem
etiam nutritia commendat (ii). Et nil obstare putat, quo minus alimentum ejus-
modi stomacho vel umbilico appositum, ibique ob partium circumstantium calo-
rem, & membrorum tractricem vim, ad interiores sedes raptum, & elaboratum nu-
trire possit. Præsertim cùm *sec. Hippocr.* (kk) fetus per umbilicum attrahat alimen-
tum. Allegat etiam in seqq. (ll) in suam sententiam experientiam: Septimestrem
enim

(hh) l. de
aliment.
n. 5.

(ii) l. i. de
Med. Princ
hist. Dub.
iv. p. 19. c. 2
(kk) l. de
nat. puer.
(ll) l. c.
obs. xi.

enim vidit, quæ igni correpta, septem diebus sine ullo cibo assumto, nutrientibus Empl. umbilico assidue admotis, ad octavum diem sævitiem morbi subterfugiens, vitam produxit, & evasit. Hanc Zacuti sententiam non imperitam censet Philosophus quidam *ap. Contr. Vict. Schneiderum* (m) *Negat* v. eandem *Otto Casmannus* (nn). Obstare qq. videtur, & in infante arcta umbilici ligatio, & in adulto crassities cutis atque membranæ, quo minùs aliquid crassij & corpulenti nutrimenti per illum subire possit. Vt taceam, nullâ ratione probabile videri, quod absque præviâ in ventriculo coctione cibus aliquis in sanguinem & succum nutritium verti possit; cum necessariò fermento imprægnandus, & in chyli formam transmutandus priùs sit. Illud quidem faciliùs concedi potest Zacuto, quòd succi illi, quos commendat, cum plerique omnes valdè sint spirituosij & penetrantes, *ad reficiendos spiritus* aliquid conferre possint, quo nomine & *Bern. Sævalve* (oo) admittenda censetur ejus sententia: extra v. hoc somniare eum dicit, quòd crediderit septimestrem nutritam fuisse per umbilicum. Hinc talia, sub ventriculi nomine, fundit verba: Possint tenuiores Emplastrorum nutrientium partes calore elici; possint per pororum contactum in capillares rapi venas: cumq; regressivo sanguine subire cor: vis tn. si qua resectiva, non languidis partibus erigendis, sed spiritibus saltem proderit. Non est strenuitas externo auxilio tanta, sit licet multi habitûs, promptèque penetrans succus carniû, ossa vinosa, & quicquid horum. Præcipiti autem virium lapsui ut succurrant, non sanè umbilico, non regioni meæ, sed thoraci applicanda erant.

C A P. X I.

Cum usu Medico claudit.

Umbilici tandem ea est nobilitas, ut ne quidem jam avulsus ab homine, utilis homini esse desinat: *Ipse enim non rarò medicamenti formam induit, operaturque.* In libro MS. variorum *εὐνοπίων* Anonymi cujusdam, invenit *Excellentissimus Dn. Praeses, Patronus noster atque Præceptor, dum Vita suppetet, magnificandum* ex cujus communicatione habeo, sequentem hanc Panacæam, contra omnes morbos, uti vocat Auctor ille: Recip. Centrum Microcosmi, intellige die Schnur / thu es in ein Phiol oder Kolben, glaß zu cæco Alembico, laß es in digestionem stehen / biß es zu einem Wasser / vnd ferner wieder trocken wird; Diß soll man versuchen auff ein 2. oder 3. gran. Videbis mirabilia in omnibus morbis, *Schröderus* (pp) eosdem ferè usus adscribit umbilico infantis deciduò, quos secundinæ: hinc in hujus defectu illum vult substitui, & magnifieri dicit *ad strumas gutturi* tollendas, calcinatum sc. & in aqua abrotani quotidie exhibitum, pondere $\frac{3}{4}$ ß. idque lunâ crescente. Porro Eundem commendat in *Epilepsiâ*: in quo consentientes habet alios, qui tamen diversâ eum exhibent formâ. Quidam enim existimant, particulam illam *pulverisatam* plurimum valere epileptico puero exhibitam, teste *Beckero* (qq): Alii v. *sanguinem ex eo promanantem* commendant: Hinc *Fr. Helvetius* (rr) inquit: Quicumque infantibus 3. aut 4. gtt. sanguinis ex præsectâ chordâ manantis dederit absorbendas, præcavebit, ut illi nunquam corripiantur morbo fontico s. comitiali. Ad *philtrea* compescenda refert *Schröder. l.c.* eundem umbilicum conducere; aliquos tamen in hoc contradicentes habet, qui potius *pro philtreis inde parandis* inservire ajunt; uti ex *Lauremberg. Diss. Anat.* refert *Becker. l.c.* Qui addit, fabulas has esse pueriles, & fortè melius succedere, si allegoricam & secretiorem iis interpretationem adscribas; Si sc. puellæ eò deveniunt familiaritatis, ut sive palpan- dum Viris umbilicum suum, sive spectandum offerant, dubium nullum sit, quin

(mm) l. de off. cribrif.

p. 64.

(nn) l. 2. Psycholog c. 12. quæst. ult.

(oo) in ventr. querel. & opprobrii. p. 74.

(pp) Pharmac. l. V. p. m. 288.

(qq) l. c. l. 1. c. 8. p. 28.

(rr) dirib. Med. c. 16.

p. 117.

igniculum illi concepturi sint, & facile descensuri in placidum amorem. *Alex. Benedictus* prodidit, umbilici infantis portionem sponte deciduam, quoquomodo in cibo vel potu sumtam *restibilem fecunditatem* conciliare, quod de eo testantur, *Ioh. Riolanus* (ss) *Beckernus* l.c. Consentit etiam *Rattray*: aliosque idem asserere refert *Corbej.* (tt) *Ad partus* prætereà alios *procurandos* nonnullos exsiccatum reservare umbilicum, testatur *Bartholinus* (uu). Inprimis v. *Ioh. Schenck.* (vv) inter rara, nova, & vulgò incognita *ad partum facilitandum* remedia refert, & ut efficacem prædicat seq. pulverem: Ourachus cum duobus vasis abluitur vino albo, in fictili novo uritur in clibano, denuò aquâ Endiviæ & vino abluitur, servetur usui: Recip. hujus cineris urachi ʒij. Cinnam. ʒß. piper. long. galang. ana ʒj. sem. plantag. & endiv. ana ʒß. sem. lavend. ʒiv. F. pulv. cum aquis prædictis & vino albo, si febris desit. *Weickard.* (xx) eundem pulv. ad partum accelerandum efficacissimum tradit: sed loco aquarum dictarum, & vini albi, addit hæc: Recip. hujus pulveris (quem subtilissimum vult fieri) ʒij. Conf. alkerm. totid trochisc. de myrrh. ʒß. Castor. ʒj. Sumatur id cum aq. Sabin. & artemis. p.æ. Contrà *amuleti instar* in brachiis *gestatum* umbilicum, *conceptum inhibere* dicit *Alex. Benedict.* ap. cit. auct. Porro *Becker. l.c.* meminit, retulisse sibi aliquando Ictum Megapolitanum, ibidem loci portionem illam umbilici deciduam, recentem adhuc, supra bacillum duci, ut cavitas conspicua maneat, per quam postea conspiciendos sæpè infantes cogant, quo sic acutiorem videndi facultatem contrahant. Sed ut fabulæ hoc magis, vel frivolæ alicui superstitioni simile videtur, ita ad veritatem propiùs accedere censemus effectum illum, quem *Hartmannus* teste *Schrödero l.c.* umbilico deciduo tribuit, facere sc. ad *nævus maternos* tollendos. Cui calculum adjicit *Poppius*, [yy] qui ita adhibendum præcipit: Sumatur umbilici decidua pars, eaque cum aq. vitiorum (*Feldwicken*) destillatâ misceatur, & indies ter locus inungatur, & relinquoas ibidem, donec siccescat; tam diu qq. id continuetur, quamdiu te gestavit mater sic affecta. Valere adversus *colicos dolores*, & vel juxta *Trallianum* (zz) *formâ amuleti* gestatum; ad stipulantur *Rhases*, *Ronssesj.* (a) *Cardan.* (b) *Heurn. Macisf.* (c) *Iac. Martini* [d] & *Crollius* [e] *Vel* juxta *Poppium* [f] ʒj. cum vino generoso deglutitum prodesse dicitur: Dubitatur *Primerosso* (g) Affirmantes, ut *Poppius l.c.* & *Paschalis* (h) umbilicum exhibendum volunt Viro, puelli; feminae, femellæ. Nos hæc nemini obtrudimus tq. indubitatâ veritate nixa, & vel ex ipso qf. Apollinis tripode desumpta; cum probabili ratione quodammodo destituta videantur: interim tamen, ut illicò tq. falsa omnia proscribamus, prohibet itidem Medicorum nonnullorum, qui ad experientiam provocant, auctoritas. Suus per nos stet cuivis honos. Placuit idcirco non solum hic, sed & per omnem dissertationem ipsos Auctores suam pandentes sententiam adducere, tum ut liberam Tibi B. L. optionem relinquereimus arripiendi, quicumque præcæteris probabilissimus videbitur: tum ut significaremus insimul, per quos hucusque profecerimus: quod ut fateri ingenui duximus esse pudoris; ita mitiorem à Te speramus censuram, si fortè in quibusdam cum Magnis Viris hallucinati fuerimus.

TIBI interim DEVS T. O. M. sine Cujus ope ad umbilicum aliquid deducere nulli concessum, quod tam larga nobis largitus es auxilia, quibus sufficientes fuimus umbilico nostro ad umbilicum perducendo, grates reponimus ad umbilicum nunquam perducendas!

GEORGIUS FRANCUS,

MEB. D. & P.P. h. t. DECANUS

CL^{mo} JUVENI

BENEDICTO HERMANNO MEO

S. P. D.

Quinquennium fere Pythagoricum inter alteriores Musas bene-
latuisti, & siluisti docte! Multi cruda sua studia nondumq;
concocta in chartam revomunt cum legentium nausca, ubi conspici
cupiunt, non proficere. Certe non prodest cibus, nec corpori accedit;
qui statim sumtus emittitur. Tu vindicas Te tibi & tempus; &
dum omnes complecteris horas, fiet, ut minus pendeas ex crastino,
quia hodierno manum injicis. Inter ipsa Artis illustria incrementa in-
crementa ipse capis, & pergis ad augmenta nobilia. Stupes illa mecum
& veneraris non quia à novis, sed veracibus sunt. Multi enim
auctoritatem habent senum, vitia vero puerorum. Qui solcite
consulit mortuos, celebrius vivet. Tu nocturna diurnaq; versas
manu Veterum exemplaria novorumq;, & quod me vides facere,
facis recte. Ego interim cupio in Te omnia transfundere, & in hoc
gaudeo aliquid discere, ut doceam. Testem diligentiae Tuae sisto,
quam sistis luci publicae, doctissimam Tuam de Umbilico disputa-
tionem, quae demorsos sapit ungues Tuos, Tuo Marte Tibi paratam!
Non possum ergo non gratulari ILLUSTRIPATRIAE hac de
spe egregia: CL^{mo} PARENTI de filio obedientissimo, de indu-
strio vero discipulo mihi. Qui si porro perseverabis labore impro-
bo, brevitanta studia, ceu eruditum hunc Umbilicum, ad umbili-
cum perduces feliciter, eorumque lauta expectabis præmia, quia

Nunquam potest non esse Virtuti locus !

Scribo in Museo meo Anno

M DC LXXIII.

O He ! mox satis est ohe laborum !
 Sic qui noctibus & diebus ardens
 Incumbis *veteris novaeque* sortis
 Libris ; Tu *vetus* inde habeto nomen ;
 Et *nova* celebrere dignitate ;
 Perge , & pervenies ad umbilicum !
 Sit Tuus Tibi testis Umbilicus !

*Amicorum non infimo & Commensali suo suavissimo
 amicitia gratia hac apposuit*

Johannes Dolæus, Med. Stud.
 Francoth. Pal.

W Je dann O treuer Freund / wie daß du durch dein schwingen
 So hurtig schwingest dich hin auff des Pindus Spizen /
 Hat schon bey dir gefrucht die süsse Tugend Saat ?
 Vnd sich so bald zu dir jen's Götter Kind genah't
 Die allzugrosse Kunst ? Hat dir das Herz gerühret
 Durch ihren süssen Lohn / wordurch sie dich geführt
 Dort zu dem Phœbus Volck / das allzuschönste Gut
 Die Weißheit ? so nun dich getrânckt mit ihrer Blut.
 Ey nun so fahre fort / weil du noch siehest grünen
 Die Blüte deiner Jahr / daß du mög'st baß verdienen
 Den Ehren Palmen Zweig / den selbst Apollo dir
 Wird geben / wo du so trachtest nach der Tugend Bier.

Dieses hat seinem trauten Freund vnd werthen Stuben
 Gefellen dem Herrn Respondenti auß heischender
 Schuldigkeit auff vnd hinzu gesetzt

Johann Christoph Heerwart/
 von Eysenach / B. R. B.